



Ernesto Marra

Laureato in Medicina Veterinaria, specializzato in Ispezione e Controllo degli Alimenti di O. A., Micologo iscritto al Registro Regionale e Nazionale dei Micologi.

In servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza quale Dirigente Medico Veterinario (Area Igiene degli Alimenti di O. A.) e Responsabile dell'Ispettorato Micologico presso il S.I.A.N., Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, svolge compiti di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Consulente di Micotossicologia per le strutture sanitarie della Provincia nei casi d'intossicazione da funghi. Docente nei corsi di aggiornamento per Micologi. Rappresentante dell'Ispettorato Micologico, docente e membro di commissione per la supervisione dei corsi e degli esami per il rilascio dei permessi di raccolta Tessere professionali. Già Direttore del Comitato Scientifico della Confederazione Micologica Calabrese. Coordinatore Scientifico del "Centro di Eccellenza" I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) presso la Confederazione Micologica Calabrese dal 2013 al 2018.



Dario Macchioni

Si occupa da circa 33 anni di Prevenzione e di Sicurezza Alimentare, dei quali gli ultimi 18 presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria. Già responsabile dell'Ufficio Igiene Alimenti, è supervisore regionale del Piano della Prevenzione e responsabile delle attività di prevenzione delle MTA (Malattie Trasmesse da Alimenti) e intossicazioni da funghi.

Laureato in Farmacia ha conseguito il master in Epidemiologia e Salute della Popolazione.

Micologo iscritto al Registro Regionale della Lombardia e al Registro Nazionale dei Micologi, è stato componente della Commissione Nazionale Funghi, presso il Ministero della Salute per la revisione della normativa di settore e componente del Comitato Tecnico Regionale per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria. Ha diretto corsi per Micologi.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA**



REGIONE CALABRIA



conoscere i funghi

la raccolta
il consumo
la commercializzazione

Manuale di base per la formazione dei raccoglitori e per i Corsi di formazione propedeutici
al rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione dei funghi per la vendita al consumatore finale
D.P.R. 14 Luglio 1995 n. 376 – L.R. 26 Novembre 2001 n.30

a cura di

Ernesto Marra e Dario Macchioni

2° edizione

SI RINGRAZIANO

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Dott. Antonio Graziano

il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Dott. Martino Maria Rizzo

SI RINGRAZIANO

per la fattiva collaborazione:

GENNARO DI CELLO	Micologo, Lamezia Terme (CZ)
VINCENZO CURCIO	Micologo, Lamezia Terme (CZ)
ANTONIO DE MARCO	Micologo, Cassano allo Jonio (CS)
ANTONIO CONTIN	Micologo, Castrovillari (CS)
MATTEO CARBONE	Esperto in Micologia, Genova
ANGELO BINCOLETTI	Esperto in Micologia, Meda (MI)
ARTURO BAGLIVO	Esperto in Micologia, Lecce
BENIAMINO RECCHIA	Micologo, Castrovillari (CS)
GIUSEPPE CIULLI	Gruppo Micologico G.E.M.A., Avezzano (AQ)
RAFFAELE CAPANO	Micologo, Portici (NA)
GIANCARLO PARTACINI	Esperto in Micologia, Levico Terme (TN)
CARLO AGNELLO	Esperto in Micologia, Mesagne (BR)
GIOVANNI SICOLI	Micologo, Amantea (CS)
MARCELLO MARRA	Informatico, Acri (CS)

che hanno consentito l'uso di loro materiale fotografico per la
realizzazione del lavoro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

conoscere
i funghi
la raccolta
il consumo
la commercializzazione

Manuale di base per la formazione dei raccoglitori e per i corsi di formazione propedeutici al rilascio
dell'attestato d'idoneità all'identificazione dei funghi per la vendita al consumatore finale
D.P.R. 14 Luglio 1995 n. 376 – L.R. 26 Novembre 2001 n.30

a cura di
Ernesto Marra e Dario Macchioni

2° edizione

Realizzata nell'ambito delle attività conformi al Piano Regionale di Prevenzione 2020 - 2025 PL 14

Introduzione

Nel 2016, gli Autori delle presenti pagine hanno condotto uno studio epidemiologico per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, sulle intossicazioni da consumo di funghi nel territorio regionale, i cui risultati sono consultabili in Rapporti ISTSAN 17/41 (Istituto Superiore di Sanità).

Lo studio ha compreso un'indagine qualitativa partendo da "focus group" che hanno coinvolto Micologi; Medici; Associazioni Micologiche; Dipartimenti di Prevenzione; Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e raccoglitori di funghi, con l'intento di rilevare, tra l'altro, il grado d'integrazione ospedale-territorio nei casi d'intossicazione da consumo di funghi, il livello di fruizione dei servizi di prevenzione resi dalle AA.SS.PP. ai privati raccoglitori, nonché fare emergere il grado di conoscenza dei principi di prevenzione da applicare nella raccolta dei funghi.

Tra gli elementi conclusivi emersi, è risultata allarmante, nei "raccoglitori occasionali", la scarsa percezione della pericolosità del consumo indiscriminato dei funghi, con una sottovalutazione del rischio a cui spesso vengono esposti anche i rispettivi familiari e la permanenza, ancora oggi, di retaggi culturali e false credenze popolari relative al riconoscimento della presunta commestibilità.

I dati epidemiologici derivanti della consulenza micotossicologica resa dai Micologi degli Ispettorati delle AA.SS.PP. ai Pronto Soccorso ospedalieri regionali nei casi d'intossicazione, sono specchio di questa situazione. Nel periodo Gennaio 2012 - Giugno 2023, infatti, oltre alle diverse decine di ricoveri per intossicazione più lievi, sono stati ben 28 i pazienti coinvolti in casi d'intossicazione grave da funghi, che hanno causato 5 decessi e 2 trapianto d'organo. In tutti i casi si è trattato di avvelenamento di tipo falloideo, avvenuto fra le mura domestiche, per raccolte private di funghi non sottoposti a controllo preventivo presso l'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria.

In un quadro così preoccupante, oltre che in termini di sofferenza umana anche in termini di costi sanitari, mettere in atto ogni possibile misura preventiva continua a essere un'impellente necessità.

E' in questo contesto che, come prosieguo delle precedenti iniziative di divulgazione e formazione verso vari target di popolazione, si inserisce il presente manuale con il quale, senza volontà di essere esaustivi, si intende veicolare gli elementi base della micologia generale, dalla biologia al riconoscimento delle principali specie fungine, all'indicazione delle regole per il commercio, ai consigli per il consumo, fino a giungere a trasmettere essenziali informazioni di carattere micotossicologico e corretti comportamenti da adottare in caso di malessere dopo aver consumato funghi.

Ogni step è trattato in modo sintetico, privilegiando l'impatto del confronto visivo (oltre 500 foto in alta risoluzione) tra le principali specie commestibili e quelle tossiche con esse confondibili, con il fine di offrire, prioritariamente ai raccoglitori, ma anche a qualsiasi cittadino, elementi fondamentali di prevenzione per un consumo consapevole dei funghi, spunti per ulteriori approfondimenti e motivi per ritrovare, nella lettura, il proprio ambito d'interesse compresa la necessità di preservare, per le future generazioni, lo straordinario patrimonio naturalistico regionale di cui oggi godiamo.

Presentazione 2^a edizione

Dott. Antonio Graziano

*Direttore Generale
Azienda Sanitaria
Provinciale
Cosenza*

Cosenza 30 Ottobre 2023

La raccolta, la preparazione e il consumo dei funghi sono parte viva della tradizione regionale da tempo immemore.

La ricchezza e varietà di specie presenti nei nostri boschi di montagna e di collina, se da un lato testimonia la pregevole biodiversità del territorio, dall'altro, determina la necessità di elevare il livello di attenzione e precauzione per limitare il rischio di consumare sulle nostre tavole specie fungine tossiche o mortali spesso molto simili a quelle commestibili.

È per questo motivo che, con grande convinzione ed in linea con gli indirizzi regionali presenti nel Piano Regionale della Prevenzione, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha ritenuto utile procedere alla stampa del manuale aggiornato "Conoscere i Funghi" che già, con grandi apprezzamenti, era stato pubblicato sul sito web istituzionale aziendale nel 2019 e reso interamente scaricabile al pubblico in formato elettronico.

In questa seconda edizione gli autori hanno arricchito le pagine con ulteriori immagini e informazioni, curando meticolosamente ma sempre con semplicità d'esposizione, la descrizione dei caratteri macroscopici identificativi delle diverse specie, il loro habitat di crescita e le possibili confusioni che possono ingenerarsi durante la raccolta.

Diffondere al maggior numero di persone le informazioni contenute in questo pregevole e sintetico manuale rientra, pertanto, nella mission aziendale perché la conoscenza rappresenta la principale e più efficace misura di prevenzione.

Un doveroso ringraziamento al Presidente della Regione Calabria, Commissario ad Acta per la Sanità, on. Roberto Occhiuto, per la particolare attenzione rivolta alla Prevenzione e agli obiettivi di salute previsti nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Presentazione 2ª edizione

VI

Dott. Ugo Cavalcanti

Direttore Dipartimento
di Prevenzione
Azienda Sanitaria
Provinciale Cosenza

Cosenza 30 Ottobre 2023

Nella sorveglianza dei casi/focolai di malattie trasmesse da alimenti (MTA), rientrano a pieno titolo anche quelle legate al consumo dall'alimento fungo che, per il loro esito talora letale, sono fra le più subdole e pericolose. Per tale peculiare caratteristica, la prevenzione di simili eventi, che spesso coinvolgono interi nuclei familiari, da gestire in maniera multidisciplinare, rappresenta uno degli obiettivi tesi alla tutela della salute pubblica, da perseguire in modo organico, sistematico e sinergico.

La formazione degli Operatori del Settore Alimentare e dei raccoglitori e la massima e capillare informazione ai consumatori, costituiscono strumenti di prevenzione attiva per diffondere la corretta conoscenza dei funghi e la consapevolezza dei potenziali rischi legati a raccolte amatoriali non controllate e loro consumo, sfatando pericolose false credenze che sono talora all'origine degli episodi di intossicazione.

In tale contesto e con tali finalità il manuale "Conoscere i funghi," curato con competenza e passione dai Micologi Ernesto Marra e Dario Macchioni, presenta al lettore le conoscenze essenziali relative alla complessa materia micologica, fornendo uno strumento accessibile ed efficace.

Le informazioni di carattere ambientale, le nozioni sulla biologia dei funghi, la descrizione delle specie commestibili supportata da eccellente materiale fotografico comparativo con le similari tossiche, unitamente alle puntuali informazioni di carattere sanitario sulle intossicazioni da funghi, ne fanno un valido veicolo di divulgazione e prevenzione in linea con gli obiettivi sanitari Aziendali e Regionali, contribuendo ad assicurare quella necessaria conoscenza a garanzia della sicurezza alimentare.

Presentazione 2ª edizione

VII

Dott.ssa

Maria Teresa Pagliuso

Direttore f.f. U.O.C. S.I.A.N.
Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione
Azienda Sanitaria
Provinciale Cosenza

Cosenza 30 Ottobre 2023

I funghi spontanei, per le loro peculiari caratteristiche organolettiche, sono considerati alimenti di pregio che, maggiormente nel periodo di crescita, vengono consumati da un considerevole numero di privati raccoglitori e anche diffusamente serviti nella ristorazione pubblica in diverse preparazioni alimentari.

Considerata la pericolosità di alcune specie, potenzialmente confondibili con quelle commestibili, assicurare una corretta formazione dei raccoglitori e degli Operatori del Settore Alimentare rappresenta, pertanto, una delle priorità del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) nel più vasto ambito della prevenzione delle Malattie Trasmesse dagli Alimenti.

Per tali finalità gli Autori hanno realizzato, per l'ASP di Cosenza, il presente manuale di Micologia di base "**Conoscere i funghi: la raccolta, il consumo, la commercializzazione**", pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nel novembre 2019 in formato digitale interamente accessibile al pubblico.

L'utilità divulgativa di tale originale iniziativa, efficace per l'immediatezza delle informazioni fornite veicolate da un ricco corredo fotografico, è stata favorevolmente accolta da tutte le AA.SS.PP. regionali che, a loro volta hanno pubblicato il manuale sui rispettivi siti Aziendali amplificandone la sua diffusione.

Visto l'interesse creato dalla sola pubblicazione on-line e le richieste pervenute anche da fuori regione di copie cartacee del manuale, è stata così realizzata, nell'ambito delle attività previste dal **Piano Regionale della Prevenzione 2020/25) PL 14**, la 2ª edizione finalizzata alla stampa, aggiornata ed arricchita con 22 nuove schede descrittive di altrettante specie fungine e nuove immagini, per il suo utilizzo come testo di riferimento nei corsi di formazione dei Raccoglitori e degli Operatori del Settore Alimentare previsti dalla L.R. n.30/2001, con la convinzione che la capillare informazione rappresenta un mezzo essenziale di prevenzione.

Il territorio



Sila Greca (CS) / FOTO E. MARRA



Thuriium (CS) - Litorale Ionico / FOTO E. MARRA

Il territorio della Calabria, lingua di terra che si affonda nel mediterraneo, è caratterizzato da una complessa orografia. I 780 Km di coste bagnate da due mari (con una distanza minima di soli 35 Km (istmo di Marcellinara), la presenza di complessi montuosi quali il Massiccio del Pollino (2.267 m), il Massiccio del Pellegrino (1.987 m), l'Altipiano della Sila (1.928 m), la Catena costiera (1.541 m), il Massiccio del Reventino (1.414 m), la Catena delle Serre (1.423 m), l'Aspromonte (1.956 m), fanno sì che la regione sia caratterizzata da un clima particolarmente mutevole in relazione alle altitudini ed alla esposizione.

È sufficiente, infatti, spostarsi solo di alcune decine di km, per passare dal versante Ionico, esposto ai caldi venti meridionali di origine Africana, con inverni miti ed estati calde e secche, al versante Tirrenico con inverni miti ed estati caldo-umide a causa dei venti occidentali, di origine Atlantica, che scaricano sulle catene montuose il loro carico di umidità sotto forma di nebbie e di frequenti abbondanti precipitazioni. Procedendo poi verso l'entroterra l'ambiente costiero cede repentinamente il posto a quello montano con un radicale cambiamento di habitat e di clima (Pollino, Sila e Aspromonte) che diventa rigido con inverni freddi e particolarmente nevosi, temperature invernali anche di -16° ed estati fresche spesso caratterizzate da frequenti precipitazioni. Il clima diventa invece più di tipo continentale nelle valli interne, protette dai rilievi che formano una barriera alla penetrazione dei venti marini provenienti dalle opposte coste, dove si creano le condizioni per inverni freddi e umidi con nevicate anche abbondanti ed estati calde e afose.

Tali peculiarità realizzano condizioni particolarmente fortunate e pressoché uniche per lo sviluppo delle popolazioni fungine favorendo la contemporanea presenza di specie mediterranee e di specie tipicamente alpine la cui presenza, di zona in zona nel territorio regionale, copre quasi l'intero arco dell'anno regalando spesso annate da record in termini di produzioni e di presenza diversificata.

Faggeta Loc. Trepidò - Cotronei (KR) / FOTO G. DI CELLO



La biodiversità nei boschi calabresi

Nonostante il depauperamento subito nel corso della sua storia recente a causa dei disboscamenti e degli incendi ricorrenti, il patrimonio boschivo della Calabria resta fra i più consistenti in ambito nazionale con 650 620 ettari di superficie forestale su una superficie territoriale di 1.508.055 ettari, attestando un indice di boscosità del 40,6% tra i più elevati d'Italia (IFNC, 2015). La particolarità delle foreste calabresi non è solo rappresentata in termini quantitativi ma, soprattutto, in quelli qualitativi grazie all'alta varietà di specie arboree presenti e alle diverse e complesse consociazioni che fra queste si realizzano. All'attuale condizione ha anche contribuito l'opera di rimboscamento effettuata nel periodo 1957-70 con specie autoctone e con l'introduzione di specie provenienti da altri territori (alloctone, esotiche). Tale pratica, che in alcuni casi ha creato un'invasione a danno delle specie locali, ha anche realizzato presupposti di rilevante biodiversità anche micologica. "In contesti forestali di questo tipo, rappresentati da un ventaglio diversificato di fitocenosi anche all'interno dello stesso profilo altimetrico, non è difficile immaginare come le componenti micologiche a essi associati si esaltino sia per l'alta diversità sia per la migliore espressione di componenti di una rete trofica del suolo che non ha eguali nel bacino del Mediterraneo" (Siniscalco C. et al., - ISPRA Manuali e linee guida 179/2018).

Principali essenze arboree dei boschi calabresi sono le estese foreste di faggio (*Fagus sylvatica*), pino laricio (*Pinus nigra* var. *calabriaca*) e abete bianco (*Abies alba*) sia come specie dominanti che miste; i boschi di castagno (*Castanea sativa*) e di querce (*Quercus cerris*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Quercus pubescens*, *Quercus frainetto*) con presenza di ciliegio selvatico, (*Prunus avium*); le formazioni a pioppo (*Populus tremula*), pino loricato (*Pinus heldreichii* var. *leucodermis*); le pinete naturali (*Pinus halepensis*); i boschi e le boscaglie ripariali di salici, (*Salix nigra*, *Salix caprea*, *Salix eleagnos*), ontani (*Alnus glutinosa*, *Alnus cordata*) e pioppo nero (*Populus nigra*).

Frammiste a queste s'intercala una ricca vegetazione cespugliosa costituita in predominanza da agrifoglio, (*Ilex aquifolium*), pungitopo (*Ruscus aculeatus*), corbezzolo (*Arbutus unedo*), biancospino (*Crataegus monogyna*), perastro (*Pyrus pyraeaster*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*) unita spesso alla presenza della ginestra (*Spartium junceum*, *Cytisus scoparius*) che in alcune aree, pur assumendo una presenza invasiva, regala scorci primaverili di straordinaria bellezza.

Sila Greca (CS) / FOTO E. MARRA



La ricchezza delle essenze vegetative descritta crea i presupposti per un'altrettanta variegata presenza e abbondanza di specie fungine presenti sull'intero territorio regionale, ben conosciuta da chi visita i boschi per motivi legati allo studio micologico, naturalistico o, più semplicemente, da coloro che si dedicano alla raccolta per scopi alimentari.

Tale peculiare biodiversità, ogni anno, attira Micologi, studiosi, appassionati di micologia e raccoglitori, provenienti non solo dalle regioni limitrofe ma dall'intero territorio nazionale e anche di altri Paesi, costituendo un vero e proprio "turismo micologico" che incrementa la conoscenza del territorio regionale e dà sostegno all'economia locale.

Con la volontà di attestare scientificamente tale biodiversità, nel 2012 la Confederazione Micologica Calabrese, ha avviato un'articolata ricerca collaborando con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), nell'ambito delle attività del "Centro di Eccellenza per lo studio delle componenti di biodiversità del suolo" del "Progetto Speciale Funghi" dell'ISPRA, istituito presso la stessa Confederazione.

Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati da ISPRA nel Giugno 2018, ha elaborato un totale di 45.138 segnalazioni relative ad altrettanti rinvenimenti fungini per ciascun dei quali è stato analiticamente indicato: nome della specie (secondo *Index Fungorum*), data e luogo del ritrovamento (Provincia, Comune, Località, altitudine e coordinate geografiche) informazioni relative all'habitat (principali specie vegetali presenti e tipologia del terreno secondo la Carta dei suoli della Calabria), indicazione del nome di colui che ha rinvenuto la specie e del Micologo che l'ha determinata.

La ricerca, oltre all'obiettivo di censimento e mappatura delle specie fungine presenti in Calabria (mappatura georeferenziata secondo presenza e frequenza), ha realizzato uno studio ben più articolato confluito in due distinti manuali pubblicati in rete da ISPRA:



"Abbinamento delle componenti micologiche della Calabria ai sistemi di classificazione degli habitat EUNIS e Natura 2000":

- Prima correlazione delle specie fungine delle **FORESTE NATURALI**¹

- Prima correlazione delle specie fungine dei **RIMBOSCHIMENTI**¹

Tali ricerche attestano la ricchezza e l'abbondanza delle diverse popolazioni fungine nei boschi calabresi, che conta **1.500 diverse specie** censite al 2017 (2.678 specie, comprensive di varietà e forme diverse)

rinvenute nelle due tipologie forestali: "foreste naturali" e "rimboschimenti". Tali manuali sono due opere prime nel loro genere, a livello nazionale ed europeo. Lo studio è una base di partenza per l'identificazione di altre specie che sicuramente andranno ad arricchire la lista di quelle già censite, ma è anche rappresentativo delle specie tipiche dei diversi habitat, di quelle rare con distribuzione sporadica, di quelle meritevoli di protezione e delle specie che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate come bioindicatori nelle valutazioni della qualità di un ecosistema e/o di un habitat.

¹ <https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/no-homepage/funghi-in-calabria-ispra-pubbli-ca-due-nuovi-manuali>

Per conoscere i funghi e comprendere meglio il ruolo che questi svolgono in natura, è indispensabile introdurre alcuni elementi basilari di carattere ambientale. Nessun organismo vivente ha la capacità di vivere in modo completamente autonomo, ciascuno, infatti, dipende in modo più o meno stretto dall'ambiente circostante, (rappresentato da piante, animali, ambiente fisico) che nel loro insieme costituiscono l'ecosistema in cui l'organismo stesso è inserito.

Un ecosistema, quindi, è costituito da una comunità di organismi viventi (*biocenosi*) che si trovano in una determinata area e dallo specifico ambiente fisico (*biotopo*) che condividono. In tale comunità ecologica gli stessi organismi sono in continuo rapporto di scambio tra loro e con l'ambiente in cui sono inseriti. Tale rapporto è così stretto che un evento che modifica anche uno solo di questi elementi ottiene, come conseguenza, una variazione dell'intero sistema che potrebbe rivelarsi anche irreversibile. Un ecosistema comprende diversi habitat. **L'habitat** è il luogo fisico dove un animale, una pianta o un fungo, trova le condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo e alla sua riproduzione. L'habitat in genere è caratterizzato dalla presenza di una forma vegetale o da un aspetto fisico dominante (per esempio un bosco, un prato, un corso d'acqua o un lago ecc.).

Il bosco è un ecosistema fra i più complessi e costituisce elemento fondamentale di regolazione delle condizioni di vita sulla terra comportandosi come un polmone naturale che filtra e rinnova l'aria. Le piante, infatti, grazie alla fotosintesi clorofilliana e all'energia fornita dal sole, utilizzano il carbonio dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera per produrre sostanze organiche utili al loro accrescimento liberando da tale processo l'ossigeno che consente la vita sul nostro pianeta.


Riguardo all'altitudine il bosco può essere genericamente distinto in:

- **planiziale** (o di pianura da 0 a circa 400 m s.l.m.) le cui essenze vegetative sono soprattutto costituite da macchia mediterranea, pino costiero, roverella, quercia, leccio e altre latifoglie;
- **collinare** (circa 400-600 m s.l.m.) in cui sono maggiormente diffuse querce e altre latifoglie;
- **submontano** (circa 600-800 m s.l.m.) con querce, castagno, faggio e qualche conifera;
- **montano** (circa 800-2000 m s.l.m.) in cui è diffuso il faggio, il pino, l'abete e il larice;
- **alpino** (oltre i 2000 m s.l.m.) nel quale sono diffuse essenzialmente conifere di alta quota quali abete rosso e larice per passare, con l'altitudine, ad una vegetazione sempre più bassa.

Riguardo alle specie arboree presenti il bosco può essere:


- **deciduo** se costituito da latifoglie (castagno, cerro, quercia, faggio ecc.);
- **di conifere** se costituito da aghifoglie (pino, abete, leccio ecc.);
- **puro**, nel quale è diffusa un'unica specie arborea;
- **misto**, nel quale sono presenti diverse specie arboree.

Bosco submontano deciduo di Castanea sativa loc. Adami, Decollatura (CZ) / FOTO E. MARRA




Tenendo conto dei diversi elementi che, nel suo insieme, costituiscono un bosco è facile osservare che esso appare costituito da più strati, o piani vegetazionali, tra loro strettamente correlati:

- **lo strato arboreo** o volta arborea è il più alto ed il suo sviluppo condiziona lo sviluppo degli strati inferiori. Secondo la tipologia di essenze arboree di cui è costituito, esso influisce direttamente sulla quantità di luce e sull'umidità disponibile che rappresentano due fattori vitali per gli strati sottostanti. La volta arborea fornisce ombra e nutrimento (sostanza organica) alle popolazioni viventi che colonizzano lo spazio sottostante (piante, animali, insetti e batteri) condizionandone presenza, varietà e numero;
- **il sottobosco**, livello immediatamente sottostante che, a sua volta, è costituito da:
 - **strato degli arbusti**, rappresentato da arbusti, sterpi e giovani piante in fase di sviluppo;
 - **strato erbaceo o lettiera** costituito erbe, fiori, felci, ecc. nonché da **muschi** e **funghi** che si sviluppano sui resti di materiale organico o su roccia così come accade per alcuni licheni;
- **il suolo** rappresenta la parte del bosco più intensamente ricca di vita che, nello spazio di un solo metro quadrato, può ospitare diversi miliardi di organismi viventi vegetali, animali, insetti, funghi e microrganismi diversi. L'intensa attività biologica operata da tali forme viventi nella parte più superficiale, porta alla formazione dell'**humus**, (strato fertile del suolo) costituito da un complesso di sostanze organiche e inorganiche essenziali per la nutrizione dei vegetali e che derivano dalla decomposizione di residui vegetali e animali. A questo strato segue quello delle rocce disgregate e lo strato della roccia madre.



Il suolo in sezione

Ogni singolo piano del bosco ospita dà riparo e nutrimento a diverse comunità di organismi viventi strettamente interdipendenti e sensibili ad ogni variazione a cui può essere esposto



Piani vegetazionali / ILLUSTRAZIONE E. MARRA

l'ecosistema bosco e in particolare, a quelle dovute all'intervento dell'uomo. Il taglio indiscriminato delle piante che lo compongono, l'azione devastatrice del fuoco, l'abbandono di rifiuti o il rilascio di contaminanti, sono azioni che compromettono in modo diretto e spesso irreversibile, non solo la presenza e la diffusione delle specie vegetali ma anche quella delle specie animali a esse strettamente legate.

Con le particolarità descritte l'ecosistema forestale, deve essere considerato come una complessa macchina biologica che, attraverso la fotosintesi clorofilliana, fissa, trasforma e rende disponibile per le altre forme viventi l'energia tratta dalla luce solare.

Il bosco è anche tipico esempio di "catena alimentare" in cui i diversi organismi sono strettamente interconnessi sulla base delle esigenze nutritive. Tale interconnessione è rappresentata schematicamente da una figura, la **"piramide ecologica"** (catena trofica o catena alimentare), in cui i diversi organismi sono raggruppati, a costituire i diversi livelli della piramide, sulla base del loro ruolo in natura.

Dal primo livello, costituente la base della piramide, sono pertanto rappresentati:

1. **i produttori** ossia le piante verdi che, come detto, grazie alla fotosintesi clorofilliana riescono ad utilizzare l'energia solare al fine di soddisfare le proprie esigenze nutritive a partire da composti chimici presenti nel terreno o nell'acqua. Per tali caratteristiche le piante sono **organismi autotrofi** cioè in grado di produrre da soli il proprio nutrimento;
2. **i decompositori o bioriduttori**: rappresentati da organismi di piccola e/o piccolissima taglia, invertebrati, insetti, miceli di funghi, batteri, alghe e protozoi che decompongono i resti animali e vegetali. Per tale attività i bioriduttori hanno un ruolo fondamentale in natura perché trasformano le complesse molecole organiche in sostanze nutritive semplici tali da essere nuovamente disponibili per le piante verdi (produttori) e ritornare così nel ciclo.
3. **i consumatori**: ossia gli animali, distinti a loro volta in due sottocategorie,
 - *consumatori primari*, animali erbivori o quelli che si nutrono di parti di piante fresche;
 - *consumatori secondari o superpredatori*, animali carnivori che si nutrono dei consumatori primari, ma che in alcuni casi possono anche cibarsi dei produttori.

PIRAMIDE ECOLOGICA




ILLUSTRAZIONE / E. MARRA

La tutela dell'ambiente

La raccolta dei funghi, oltre ad osservare regole di prevenzione finalizzate alla tutela della salute delle persone che li consumano, non può prescindere dal rispetto delle principali regole di tutela ambientale disciplinate da norme giuridiche e soprattutto dal senso civico. Come detto, il bosco rappresenta un ecosistema complesso le cui componenti viventi (funghi, piante, fauna, insetti) sono strettamente collegate fra di loro e con le componenti non viventi (suolo, acqua e aria) in un sistema in equilibrio.

Godere di questo complesso naturale e dei "frutti" che può offrire, senza interferire nel delicato sistema che lo governa, è sicuramente possibile e relativamente semplice già osservando una regola basilare: **nel bosco non si deve lasciare traccia del proprio passaggio**. Ogni scostamento da tale norma comportamentale può creare potenziale danno.

ABBANDONO DI RIFIUTI: qualsiasi rifiuto abbandonato nel bosco crea un danno permanente che solo apparentemente è rapportabile al tempo della sua "biodegradazione" (capacità di essere degradato in sostanze semplici grazie all'attività combinata di microorganismi, funghi e agenti atmosferici). In effetti, tale decomposizione, che si realizza in tempi anche lunghissimi (da cinquanta fino a diverse centinaia di anni per composti chimici, plastica, latta, alluminio, vetro) porta, in ogni caso, alla produzione di costituenti che permangono quali inquinanti nel suolo e nelle acque fino alla possibilità di contaminazione della catena alimentare e giungere sulle nostre tavole. Proprio quest'ultima evenienza è quanto può avvenire anche con i funghi capaci di accumulare alcuni contaminanti ambientali pur in presenza di basse concentrazioni nel terreno.

Boletus subtomentosus sviluppato all'interno di una bottiglia abbandonata nel bosco. Esposto alla mostra micologica del Gruppo "Sila Greca" Acri (CS). Rinvenimento A. PARISE

FOTO / E. MARRA



UTILIZZO DI UNCINI O RASTRELLI. Il sistema vegetativo (*micelio*) la cui fruttificazione genera ciò che comunemente è denominato fungo (*corpo fruttifero*) vive sotto ai primi centimetri del suolo costituendo una fitta rete che può espandersi anche per diverse decine di metri. L'utilizzo di attrezzi che smuovono lo strato superficiale del fogliame o del terriccio causa la frammentazione della rete miceliare danneggiando gravemente la capacità del micelio stesso di fruttificare nelle future stagioni e impoverendo il bosco di nuove nascite fungine.

DISTRUGGERE SPECIE FUNGINE RITENUTE NON COMMESTIBILI. Tutte le specie fungine, indipendentemente dal loro interesse alimentare, svolgono il ruolo primario di biodegradatori della materia organica contribuendo, assieme ai batteri, a rendere nuovamente disponibili per le piante e per gli animali che di queste si nutrono, i composti elementari di cui la stessa materia organica è costituita. Distruggere i funghi (corpi fruttiferi portatori di spore) ritenuti erroneamente di non interesse, depauperava il bosco di organismi biodegradatori impedendo, di fatto, la diffusione nell'ambiente delle spore e quindi la possibilità che da queste si generi nuovo micelio.

RACCOLTA DI PIANTE O FIORI SPONTANEI. La raccolta è disciplinata da norme nazionali e regionali. Indipendentemente dal dovuto rispetto degli obblighi sanciti, asportare qualsiasi pianta dal bosco è da considerare come azione scorretta dal punto di vista comportamentale per la conservazione di un bene comune.

ACCENDERE FUOCHI FUORI DALLE AREE ATTEZZATE A TALE SCOPO, così come gettare nel bosco cicche di sigarette ancora accese può essere causa d'innescio di incendi devastanti. Discostarsi da corretti comportamenti può rappresentare una violazione delle norme a tutela del patrimonio ambientale e boschivo sanzionabile dagli organismi di controllo qualora non costituisca più grave reato perseguibile anche penalmente.

FOTO MARCELLO MARRA



Cosa sono

La prima domanda che occorre porsi è: **che cosa sono i funghi?** Potrebbe essere immediato rispondere che si tratta di organismi appartenenti al Regno vegetale ma in realtà non è esattamente così.

I funghi hanno molte caratteristiche che li accomunano con le piante: sono spesso ancorati al terreno, hanno una composizione cellulare più affine al mondo vegetale che non a quello animale, come le piante si riproducono grazie alle spore, ma anche per riproduzione asessuata e diversamente dagli animali, non presentano un'organizzazione per organi o apparati.


Altre caratteristiche però avvicinano i funghi al regno animale: lo zucchero cellulare di riserva è il glicogeno come negli animali anziché l'amido come nelle piante; presentano alcuni aminoacidi (unità strutturali delle proteine) tipici degli organismi animali e non presenti nei vegetali; il componente della parete cellulare dei funghi (struttura di sostegno esterna alla cellula che gli conferisce rigidità e forma) non è la cellulosa come nelle piante ma è la chitina (polisaccaride), la stessa che è presente nel dermascheletro degli insetti o nel carapace dei crostacei. Ancora, a differenza delle piante nei funghi non è presente la clorofilla. Tale mancanza li rende incapaci di svolgere la fotosintesi clorofilliana, funzione attraverso la quale le piante riescono, grazie alla luce solare, a sintetizzare le proprie molecole organiche a partire da sostanze inorganiche (anidride carbonica, acqua, terreno minerale), utilizzando energia non derivante da sostanze organiche assimilate. In altri termini, mentre le piante riescono a produrre da sole il nutrimento di cui necessitano per vivere, sono cioè **organismi autotrofi**, i funghi invece, come gli animali, sono incapaci di operare tale sintesi per cui sono costretti ad assumere dall'ambiente in cui vivono le sostanze nutritive già preformate e sono pertanto **organismi eterotrofi**. Per tali particolari caratteristiche i funghi sono inseriti dalla sistematica in un Regno a se stante, di transizione fra quello animale e quello vegetale, distinto però da entrambi: il **Regno Fungi**. La moderna classificazione, infatti, superando la vecchia bipartizione in "animali" e "vegetali" ha individuato cinque regni di appartenenza degli organismi viventi.



Amanita muscaria

FOTO A. CONTIN

I REGNI DEI VIVENTI




- REGNO MONERA **organismi unicellulari più semplici privi di un vero nucleo** (procarioti);
- REGNO PROTISTA **organismi unicellulari con nucleo ben definito** (eucarioti);
- REGNO FUNGI **organismi eterotrofi ma con caratteristiche di transizione;**
- REGNO PLANTAE **organismi autotrofi;**
- REGNO ANIMALIA **organismi eterotrofi.**

Questa nuova classificazione (R. H. Whittaker 1969), collocando i funghi in uno spazio tassonomico separato, prende atto della loro complessa specificità e riconosce la necessità di un loro studio mirato. La Micologia diventa così, in tempi relativamente recenti, un ramo delle Scienze Naturali che studia i funghi secondo la rigorosa metodologia dettata da criteri scientifici. Tutto ciò ha consentito di acquisire conoscenze sempre più approfondite in materia con continue nuove scoperte, fino ad arrivare al recente utilizzo dello studio molecolare del DNA dei funghi che sta portando a una profonda revisione della classificazione sulla base delle nuove scoperte in campo filogenetico.

Ruolo in natura


I “funghi”, assieme ai batteri, furono probabilmente i primi organismi a colonizzare la terra ferma. La presenza di spore e di frammenti fungini, in un campione di roccia ritrovato nella miniera di Moody Creek, Nuova Zelanda e risalente al periodo successivo alla catastrofe che 65 milioni di anni fa determinò la scomparsa dei dinosauri, dimostrerebbe che i funghi furono le uniche forme viventi a sopravvivere a quell'evento distruttivo.



Spore e tessuto fungino ritrovate nella miniera di Moody Creek
V. Vajda, S. McLoughlin - Science 2004

L'impatto di un enorme meteorite o altro, che avrebbe creato sulla terra, per un lungo periodo, un'atmosfera fitta di polvere, impenetrabile dalla luce solare, sarebbe stata la causa della scomparsa della vita animale, così come di quella delle piante che dalla luce solare traggono l'energia vitale per la fotosintesi clorofilliana. Nei funghi la mancanza della funzione clorofilliana, unita alla capacità di nutrirsi al buio di sostanza organica, sarebbe stato il motivo della loro sopravvivenza.

I funghi, come detto, incapaci di sintetizzare da soli le molecole organiche fondamentali per la loro sopravvivenza, hanno necessità di trarle dal loro ambiente di crescita a partire da quelle preformate da altri organismi viventi.



Questa particolarità fa sì che essi, per esigenze nutritive, assieme ai batteri, rappresentino i principali agenti della decomposizione della materia organica. I funghi, operando il disfacimento del substrato su cui vivono (lettiera del sottobosco, legno, sostanze legnose, paglia, deiezioni animali, animali morti ecc.) rendono nuovamente disponibile in natura gli elementi semplici di cui la sostanza organica complessa è costituita, arricchendo così lo strato fertile del suolo di **humus**, che non è altro che il frutto della degradazione e rielaborazione della stessa sostanza organica.

Come si riproducono

20



Micelio / FOTO G. SICOLI




Quello che troviamo nei boschi e che comunemente è conosciuto come fungo, in realtà non è altro che la fruttificazione (corpo fruttifero), di un apparato vegetativo, il “**micelio**”, costituito da un intreccio di filamenti, detti **ife** che, secondo il tipo di fungo, vive interrato nei primi centimetri del suolo (per i funghi che crescono a terra) nella corteccia degli alberi (per i funghi che crescono su legno) o comunque incluso nel substrato di crescita negli altri casi.



Corpo fruttifero o fungo / FOTO E. MARRA

In condizioni climatiche di temperatura e umidità favorevoli il micelio fruttifica, dando origine, come detto, al “**carpoforo**” o “**corpo fruttifero**” che costituisce la parte visibile che viene raccolta e impropriamente denominata “fungo” così come di seguito, per semplicità, verrà indicato.


I funghi si riproducono tramite le **spore** che per la loro funzione possono essere paragonate ai “semi”. Sono, infatti, cellule specializzate con funzioni riproduttrici che germinando e dopo diverse fasi, hanno la capacità di riprodurre un nuovo individuo. Nei funghi dotati di gambo e cappello le spore sono prodotte nella parte inferiore di quest’ultimo detta **IMENIO** o “parte fertile”. Dal fungo maturo, a più gittate, è emessa, nell’ambiente, un’ingente quantità di spore che seppure singolarmente invisibili a occhio nudo, nella massa costituiscono una vera e propria polvere sporale, ben visibile, che si deposita non solo nell’area adiacente al fungo stesso ma, poiché leggerissima, anche a grande distanza per azione del vento, della pioggia degli insetti e degli animali che la trasportano passivamente. Le spore hanno forma, dimensione e colore diverso nelle diverse specie fungine.



Spore al microscopio ottico / FOTO V. CURCIO

Se si ripone il cappello di un fungo maturo, privato del gambo, sopra un foglio di carta, dopo alcune ore è possibile osservare, in modo diretto, il deposito sporale in massa. Nel caso di un fungo a lamelle le spore, ricadendo sul foglio si accumulano riproducendo un calco degli spazi lamellari. Nella foto a fianco il deposito sporale, dal tipico colore rosa salmone, di *Entoloma sinuatum* (fungo tossico).

Una volta depositata su un substrato favorevole alla crescita, sia esso terreno, legno o altra sostanza organica, in condizioni climatiche idonee, (giusto grado di temperatura e di umidità) la spora è in grado di germinare e formare così un filamento, o ifa, composto da cellule filiformi che presto si ramifica dando origine al “**micelio primario**”. A questo stadio il micelio però non è ancora capace di fruttificare e per poterlo fare occorre che possa unirsi con un micelio primario proveniente da una spora di carica sessuale opposta dando origine così al “**micelio secondario**”, che è il vero organismo fungino che si ramificherà nel substrato e in condizioni ottimali genererà il corpo fruttifero portatore di nuove spore che daranno origine a un nuovo ciclo.



Polvere sporale in massa su carta FOTO G. DI CELLO



Emissione del micelio primario al microscopio ottico FOTO G. GREGORIO

Emissione sporale FOTO A. DE MARCO



21



FOTO V. CURCIO

Gyromitra gigas - specie saprofita - **TOSSICA**



FOTO V. CURCIO

Come si **nutrono**

Le specie fungine presenti sulla terra (macrofunghi o funghi superiori) si calcola siano diverse centinaia di migliaia ma, sulla base delle diverse esigenze nutrizionali tutte le specie possono essere raggruppate in soli tre gruppi. Tale suddivisione tuttavia non è rigida ma, per alcune specie, è collegata alla diversa disponibilità di nutrimento.



Coltivazione di *Pleurotus ostreatus* FOTO E. MARRA

Saprofiti: si nutrono di sostanze organiche morte, vegetali o animali; si sviluppano, pertanto, sul materiale in decomposizione del sottobosco, (fogliame, rami, erba secca ecc.), sulle deiezioni animali o su organismi animali morti. Con la loro azione demolitrice (producono enzimi capaci di degradare, ad esempio, la cellulosa e la lignina) i funghi saprofiti, assieme ai batteri, svolgono un ruolo fondamentale nelle catene alimentari in quanto decompositori, capaci di trasformare i detriti organici in elementi inorganici o meno complessi (acqua, sali minerali, anidride carbonica) rendendoli nuovamente disponibili in natura. Sono specie saprofite alcuni fra i più conosciuti funghi commestibili quali Morchelle, alcuni "prataioli" (genere *Agaricus*), le "mazze di tamburo" (genere *Macrolepiota*) e tutti i funghi coltivati (ad esempio specie del

genere *Pleurotus*, *Agaricus*, *Agrocybe* ecc.), ma anche funghi non commestibili o tossici.

Parassiti: si nutrono a spese degli organismi viventi, piante o animali, causandone spesso la morte. Generalmente tali funghi aggrediscono piante già indebolite per condizioni ambientali naturali o altri fattori fitopatologici intercorrenti che, debilitando le loro difese naturali, facilitano l'attacco da parte del parassita. In tal caso i funghi parassiti svolgono anche una funzione bio-regolatrice poiché operano una selezione naturale. Accelerando la morte di piante non più sane contribuiscono a creare spazio e rendere disponibile nutrimento vitale per quelle sane favorendone così il loro sviluppo. Il più noto fra i funghi parassiti è *Armillaria mellea* (conosciuto come chiodino) che spesso aggredisce la pianta ancora in vita, la conduce a morte e poi continua a svilupparsi sui resti in disfacimento comportandosi così anche da saprofita.



Armillaria mellea

FOTO G. DI CELLO



FOTO A. CONTIN




FOTO A. CONTIN


Simbionti: stabiliscono uno stretto rapporto, (*micorriza*), con le radici terminali di alcune piante e attraverso tale relazione, entrambi gli organismi traggono reciproci benefici. Il micelio riceve dalla pianta le sostanze nutritive che non sarebbe stato in grado di sintetizzare da solo, mentre la pianta utilizza la fitta rete miceliare come una sorta di prolungamento del proprio apparato radicale aumentando così la superficie di assorbimento. Il vantaggio che la pianta riceve dalla micorriza con i funghi è rilevante, le radici, infatti, accrescendosi di pochi centimetri l'anno, provocano un inesorabile impoverimento del suolo nell'area attorno all'apparato radicale a causa del continuo prelievo di elementi nutritivi. Il micelio, invece, alla ricerca di nuove aree ricche di nutrienti, si accresce, in ogni direzione, anche per diverse decine di metri e ad una velocità che è stata stimata essere superiore da dieci a cento volte quella delle radici delle piante. Grazie alla micorriza con il fungo la pianta riesce così a ricevere risorse minerali ed idriche da aree di suolo anche notevolmente distanti dal proprio apparato radicale con un conseguente rilevante beneficio dello stato fisiologico vegetativo. Tutto ciò assume ancora più significato se si tiene conto che la medesima pianta forestale adulta, in condizioni ottimali, può essere micorrizata contemporaneamente da 30 a 50 specie fungine diverse (Koide et al., 2000) e che, si stima, circa 80% delle piante superiori abbia instaurato simbiosi micorrizica con qualche fungo. Sono funghi simbionti i più comuni e ricercati funghi commestibili ma anche pericolose specie tossiche.



Pianta micorrizata



Micorriza / ILLUSTRAZIONE E. MARRA



Specie simbionti / FOTO E. MARRA



Amanita phalloides specie simbiote di latifoglie
(POTENZIALMENTE MORTALE)

FOTO A. CONTIN

I funghi simbiotici contribuiscono, pertanto, in modo significativo ad un più sano sviluppo della pianta, tanto da poter essere assunti quali indicatori di qualità ambientale (IserentantR.E., et al., 1976). Un bosco in buona salute può dunque essere riconosciuto anche dalle specie fungine simbiotiche che in esso crescono.

Ma il ruolo svolto dai funghi simbiotici in natura non si limita solo al vantaggioso rapporto mutualistico pianta - fungo. Recenti studi, infatti, hanno definito la fitta rete che il micelio forma nel suolo come **“Wood-wide web”** (una sorta di rete internet vegetale). Tale rete è capace di connettere fra loro piante appartenenti alla stessa specie e anche a specie vegetale diversa. Si realizza così una comunicazione diretta, da un sistema radicale all'altro, che consente l'interscambio di elementi nutritivi (Selosse et al., 2006) e di molecole chimiche che, attraverso le ife fungine, trasferiscono particolari forme di resistenza da una pianta “donatrice” verso le vicine piante “richiedenti”.

In uno studio scientifico condotto su piante di fagiolo (Zdenka Babikova et al., 2013), infatti, è stato dimostrato che, utilizzando il micelio micorrizico come condotto di comunicazione, una pianta attaccata da afidi riesce a trasmettere, alle piante vicine collegate fra loro dalla rete miceliare, la naturale capacità difensiva di produrre sostanze volatili repellenti per tali parassiti (in particolare metil salicilato) che attirano, nel contempo, gli insetti parassitoidi loro nemici naturali.



Rete micorrizica “Wood-wide web” / ILLUSTRAZIONE E. MARRA

Tutto ciò conferma il ruolo dei funghi quali componenti di fondamentale importanza per la fertilità del suolo e l'importanza della loro funzione nel complesso dell'ecosistema bosco per molti aspetti ancora non del tutto conosciuti. Salvaguardare questo delicato sistema, con comportamenti corretti che non rechino danno allo sviluppo del micelio, rappresenta una condotta rispettosa delle norme e soprattutto, una doverosa etica comportamentale di tutela degli equilibri ambientali.

La classificazione scientifica

Semplificando la complessa materia della "classificazione scientifica", si può affermare che la classificazione, in biologia, rappresenta la regola con la quale gli organismi viventi (inclusi i funghi), sono raggruppati sulla base delle caratteristiche condivise. Secondo tale criterio di tipo gerarchico, il sistema di classificazione può essere rappresentato, schematicamente, da una piramide il cui vertice coincide con il "Regno" di appartenenza mentre, scendendo nei vari livelli, la base è rappresentata dalle diverse "specie".




Illustrazione E. MARRA

Il sistema così descritto, pur se in modo schematico, rappresenta nella sostanza quanto venne ideato e descritto dal naturalista svedese Carl von LINNÉ nel 1735 nella sua opera *Systema Naturae*, con la quale egli definì il metodo per la classificazione scientifica. Tale sistema, pur con le inevitabili revisioni apportate dalle nuove acquisizioni scientifiche, è lo stesso che ancora oggi viene utilizzato dalla moderna classificazione.

La classificazione empirica

I funghi comprendono specie che per dimensioni variano da quelle di singola cellula microscopica a quelle di strutture grandi e complesse come i comuni "funghi di bosco". Sulla base di tali caratteristiche, tralasciando quindi di addentrarci nella articolata classificazione scientifica, una classificazione "empirica" suddivide i funghi in: **Micromiceti** e **Macromiceti**.

I MICROMICETI, detti anche "funghi inferiori" generalmente non sono visibili a occhio nudo e in alcuni casi, ricoprono un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Fra questi:



- **lieviti** (formati da un unico tipo di cellula) indispensabili nella produzione alimentare. È un fungo il *lievito di birra* (*Saccharomyces cerevisiae*) che consente la lievitazione degli impasti di farine alimentari. Normalmente presenti sugli acini di uva matura come componenti della *pruina* (sottile strato biancastro ceroso che ricopre l'acino) o nelle granaglie utilizzate per la produzione della birra, i lieviti consentono la fermentazione delle bevande alcoliche;

- **muffe** (funghi pluricellulari) diffusissime in natura, che in presenza di umidità possono invadere anche le nostre abitazioni o i nostri alimenti causandone spesso la loro non commestibilità ma che, in alcuni casi, forniscono ad altri alimenti particolari caratteristiche di pregevolezza tipiche, così come avviene nel Gorgonzola con l'inoculazione di *Penicillium glaucum*.



Altri micromiceti possono essere dannosi per le piante (funghi fitopatogeni) ed essere così causa d'ingenti perdite nelle produzioni, come nel caso del "mal bianco" della vite causato dalla proliferazione sulla pianta di *Uncinula necator*.




Uncinula necator su vite




Allo stesso modo sono ancora dei micromiceti i funghi patogeni, **dermatofiti/tricofiti**, che possono svilupparsi sulla pelle dell'uomo o degli animali e che sono responsabili di micosi cutanee.

I **MACROMICETI**, detti anche funghi superiori, possono completare il loro ciclo vitale sia interrati (**funghi ipogei**), come nel caso dei tartufi, che fuori dal terreno (**funghi epigei**) i quali rappresentano i funghi di bosco comunemente intesi.




I Macromiceti, oggetto d'interesse per la raccolta e la commercializzazione, appartengono essenzialmente a due grandi divisioni o raggruppamenti: **Basidiomiceti** (*Basidiomycetes*) e **Ascomiceti** (*Ascomycetes*). Il loro nome è legato a differenze microscopiche relative alla formazione delle spore.

Nei **Basidiomiceti**, infatti, le spore si formano all'apice di speciali organi microscopici chiamati **basidi**, mentre negli **Ascomiceti**, le spore si formano in strutture a sacchetto detti **aschi**.



Basidi con spore al microscopio ottico / FOTO V. CURCIO



Aschi con spore al microscopio ottico / FOTO V. CURCIO

La nomenclatura

Si deve sempre a Carl von LINNÉ l'introduzione della nomenclatura scientifica "binomiale", tutt'oggi utilizzata, che ha dato un "**nome**" a tutti gli esseri viventi in lingua latina. Come suggerisce il termine "binomiale" il nome scientifico di una specie è rappresentato dalla combinazione di due nomi scritti in corsivo:

- il primo (nome generico con l'iniziale maiuscola) rappresenta il nome del **genere** cui appartiene la specie (es. *Boletus*, *Macrolepiota*, *Suillus*, ecc.);
- il secondo (nome specifico con l'iniziale minuscola) è costituito da un epiteto che distingue quella singola **specie** dalle altre appartenenti allo stesso genere (es. *edulis*, *procerus*, *luteus* ecc.).

Volendo rappresentare con un esempio quanto appena detto, nel caso di *Boletus edulis* (il comune porcino) la sua classificazione è così inquadrata:



REGNO: **Fungi**
 DIVISIONE: **Basidiomycota**
 CLASSE: **Agaricomycetes**
 ORDINE: **Boletales**
 FAMIGLIA: **Boletaceae**
 GENERE: **Boletus**
 SPECIE: **edulis**
 = **Boletus edulis**

La determinazione

Con il termine *determinazione o riconoscimento*, riferito ai funghi, s'intende la metodica che consente di poter identificare, attraverso il rilievo di elementi macroscopici, microscopici o mediante l'utilizzo di reagenti chimici, il genere e la specie alla quale appartiene un determinato fungo fra le centinaia di migliaia di specie fungine esistenti.

32

Come si può facilmente immaginare è un processo molto complesso cui sono preposti i Micologi degli Ispettorati Micologici, al fine di fornire indicazioni sulla commestibilità dei funghi ed i Micologi e gli Esperti in Micologia per motivi di studio e divulgazione. Le informazioni che vengono di seguito riportate, pertanto, essendo rivolte ai raccoglitori, hanno lo scopo di fornire solo gli elementi di conoscenza generale utili al riconoscimento delle principali specie commestibili o tossiche, rinviando, per un approfondimento, ai testi di micologia che trattano nel dettaglio la materia e ad attività formativa specifica.

L'osservazione

Sapere riconoscere significa, prima di ogni cosa, **sapere osservare**.

OSSERVAZIONE MACROSCOPICA

Un'attenta osservazione macroscopica (diretta) del fungo fresco nella sua interezza (così come deve essere raccolto), consente, in molti casi, di cogliere quelle differenze nell'aspetto esterno (cappello, gambo, lamelle, tubuli e pori, colore della carne ecc.) che permettono di distinguere una determinata specie fungina dalle altre in maniera piuttosto agevole.



Reazioni macrochimiche di diversi reagenti su gambo FOTO V. CURCIO

OSSERVAZIONE DELLE REAZIONI MACROCHIMICHE

Spesso però le differenze sono così impercettibili che la sola osservazione dei caratteri direttamente rilevabili non è sufficiente. In tali casi è possibile fare ricorso all'utilizzo di particolari reagenti chimici i quali, messi a contatto diretto con i tessuti fungini, provocano una reazione con i componenti di quest'ultimi che si evidenzia con un appariscente cambiamento di colore dell'area trattata (**reazione macrochimica**). La diversa colorazione assunta fornirà indicazioni di aiuto per individuare la specie.

OSSERVAZIONE MICROSCOPICA

Prevede l'utilizzo del microscopio ottico per mezzo del quale vengono osservate le differenze microscopiche strutturali dei diversi tessuti fungini o delle spore. Con tale metodica vengono altresì tratte utili indicazioni anche dall'osservazione delle differenti colorazioni che possono assumere tessuti e spore quando esposti ai diversi reagenti chimici (**reazioni microchimiche o micro reazioni**). Poiché le due ultime metodiche sopra accennate prevedono conoscenze approfondite della materia, di seguito sono fornite le descrizioni dei differenti caratteri morfologici, utili all'identificazione, apprezzabili con la sola osservazione diretta.



33

I caratteri morfologici

La morfologia è una branca della biologia che studia l'aspetto e le forme di un organismo vivente. Lo studio dei caratteri morfologici in micologia, pertanto, non è altro che l'osservazione delle forme e delle strutture esterne che caratterizzano, in modo diverso, ciascun fungo. Se è vero che in alcuni casi la conoscenza delle caratteristiche esterne (caratteri morfologici) non è sufficiente, da sola, alla corretta determinazione di un fungo, è altrettanto vero che, almeno per le specie più comuni, il puntuale rilievo dei caratteri morfologici può agevolmente portare alla corretta identificazione della specie fungina o, quantomeno, del genere cui questa appartiene.

Al fine di cogliere e comparare le differenze fra specie spesso molto simili fra loro, è necessario prendere in considerazione le singole parti che costituiscono il fungo, tenendo però sempre presente che fattori accidentali o climatici possono apportare modifiche anche significative alle caratteristiche proprie di ciascuna specie.

In particolare si deve tenere presente che cause accidentali (ad es. ostacoli incontrati durante la crescita) possono mutare la fisionomia tipica di un determinato fungo. Allo stesso modo fattori o agenti atmosferici (pioggia, vento, siccità, ecc.) possono notevolmente modificare la forma, le dimensioni, le ornamentazioni ed i colori dei funghi.

Per giungere a una precisa determinazione occorrerà quindi un'approfondita conoscenza dei caratteri morfologici delle singole specie e dei fattori che possono concorrere alla loro modificazione.

Entrando nei particolari descrittivi e prendendo in considerazione un fungo, così come più frequentemente rappresentato anche iconograficamente, questo appare costituito da cappello e gambo.

IL CAPPELLO è la parte del fungo che per prima emerge dal terreno e che, per colore e forma, attira l'attenzione del raccoglitore. Una valutazione superficiale di questi due soli elementi spesso può spingere verso conclusioni affrettate in merito ad una corretta identificazione della specie che s'intende raccogliere. Può capitare, infatti, che il fungo raccolto in base ai soli caratteri di forma e colore del cappello si riveli in realtà altro rispetto a ciò che si pensa. Per tale motivo è necessario prestare una particolare attenzione all'osservazione dell'insieme dei caratteri propri di ciascuna specie, che aiutano la determinazione, per evitare grossolani errori potenzialmente pericolosi.

Del cappello è da osservare pertanto oltre che la **forma** e il **colore** anche la conformazione del **margin**e nonché la **superficie** (cuticola) e le eventuali **ornamentazioni** presenti. Tali caratteristiche vanno osservate su esemplari freschi, sia adulti che giovani, per la possibile variabilità presente nelle diverse fasi di sviluppo anche nell'ambito della medesima specie.

Riguardo alla **forma** il cappello può essere: **convesso**, **acuto**, **ovoide**, **appianato**, **ombelicato**, **globoso**, **depresso**, **reniforme**, **campanulato**, **conico** ecc.



FOTO E. MARRA

- il **margin**e o orlo, può essere indicativo, assieme agli altri elementi, per l'identificazione della specie, questo è definito **regolare** quando si presenta come un margine continuo, **lobato** se diviso in lobi (protuberanze rotondeggianti), **striato** se segnato da rigature, **appendicolato** quando mostra appendici membranose o fiocose, **involut** se arrotondato in dentro, **revolut** se arrotondato in fuori, **denticolato** se minutamente inciso, **sinuoso** se presenta il contorno ondulato, ecc.



FOTO E. MARRA / G. DI CELLO

- la **cuticola** è una sottile membrana che riveste la superficie esterna del cappello. Per la diversa costituzione che può avere, essa conferisce al cappello stesso un aspetto diverso che diventa uno degli elementi utili per la determinazione. Il cappello può pertanto presentarsi: **squamato** (con scaglie piatte o acuminate), **zonato** (con presenza di variazioni cromatiche a disegno concentrico), **verrucoso** (con residui membranacei), **fibrilloso** (ricoperto da minute fibrille), **asciutto**, **vischioso**, **screpolato** (con lacerazioni che mostrano la carne sottostante), **squamettato** (con minute squame disseminate), **areolato** (con superficie screpolata, frantumata a mosaico), **igrofano** (con intensità di colorazione più scura legata al grado di umidità ambientale), **feltrato** (con fibrille fitte), ecc.



FOTO E. MARRA

- l'**imenoforo** costituisce la parte fertile del fungo nella quale maturano le spore. Nel caso di fungo dotato di gambo e cappello, l'imenoforo è presente nella parte inferiore di quest'ultimo e può essere costituito da: **lamelle**, (lamine disposte a raggiera intorno al gambo come negli *Agaricales*); **pliche** (pieghe o costolature come nei *Cantharellus*); **tubuli e pori**, (minuti tubicini che si aprono alla superficie con dei fori o pori) come nei *Boleti* e *Polipori*; **idni** (simili a piccoli aghi come nelle *Hydnaceae*); **alveoli** (piccole cavità, celle, come nelle *Morchelle*).




FOTO G. DI CELLO

Vi sono altri casi, come avviene nei *Gasteromiceti*, in cui l'imenoforo è racchiuso all'interno del fungo, ed assume il nome di **gleba** e le spore vengono liberate solo a completa maturazione attraverso la rottura dell'involucro esterno detto peridio.



Lycoperdon echinatum

/ FOTO E. MARRA



Lycoperdon sp (Gasteromicete) emissione sporale
FOTO A. CONTIN

In altri casi ancora l'imenio è distribuito su parte della superficie del fungo come accade ad es. nel genere *Sparassis* e *Ramaria*.



Sparassis crispa


/ FOTO E. MARRA




Ramaria formosa

/ FOTO G. DI CELLO


La diversa conformazione ed i caratteri dell'imenoforo rappresentano un elemento importante per la determinazione. Utile in tal senso è la disposizione delle lamelle rispetto al gambo che possono essere: **distanti** (terminano lontane dal gambo), **adnate** (se aderiscono al gambo), **decorrenti** (se scendono lungo il gambo) **uncinate** (se formano un'ansa prima dell'inserzione al gambo), ecc.



distanti



adnate




decorrenti




uncinate

G. DI CELLO - A. DE MARCO


Anche il portamento delle lamelle è utile all'identificazione. In base a tale carattere le lamelle possono essere: **rade**, **fitte**, intercalate da **lamellule** di lunghezza inferiore, **spaziate**, **separabili** dalla carne del cappello, oppure omogenee cioè **non separabili**, con margine **liscio** o **seghettato** ecc.



seghettate



con lamellule



spaziate



fitte

FOTO E. MARRA

Particolare rilievo nella determinazione è anche la colorazione delle lamelle che possono avere un colore proprio o assumere quello delle spore che producono.







FOTO E. MARRA - G. DI CELLO

Nel caso di **imenoforo a tubuli e pori** va osservato il colore di entrambe le strutture e l'eventuale presenza di viraggio (cambiamento di colore al tocco o all'esposizione all'aria) nonché la lunghezza dei tubuli, la forma dei pori ed il colore.



tubuli non viranti



tubuli viranti



pori non viranti



pori viranti




pori colorati

FOTO G. DI CELLO - A. DE MARCO


Nell'**imenoforo ad idni** (aculei) va osservato: il colore e l'inserzione sul gambo.



idni



non decorrenti



decorrenti

E. MARRA - G. DI CELLO - A. DE MARCO

IL GAMBO In base alla sua lunghezza è possibile distinguere gambi **lunghi** o **corti** e in merito alla posizione rispetto al cappello, **centrali**, **eccentrici** e **lateral**i. È sempre utile, ai fini determinativi, osservare se la struttura del gambo è diversa rispetto a quella del cappello e pertanto risulta facilmente staccabile da quest'ultimo. In questo caso parleremo di gambo **eterogeneo** rispetto al cappello (es. genere *Amanita*), altrimenti avremo gambo **omogeneo** (es. genere *Tricoloma*). Con riferimento alla struttura dei tessuti che lo costituiscono, il gambo si definisce **fibroso** se alla frattura i tessuti che lo costituiscono si sfilacciano (es. genere *Boletus*) o **gessoso** se la frattura avviene in modo netto (es. generi *Russula* e *Lactarius*). Anche la forma può assumere significato ai fini della determinazione, infatti, le diverse specie possono mostrare gambi **flessuosi**, **a base curva**, **obesi**, **cilindrici**, **fusiformi**, **clavati**, **ecc.** Altra caratteristica indicativa è la forma che assume la sua parte terminale (base) che può essere **bulbosa**, **attenuata**, **radicante**, **volvata**.



FOTO E. MARRA - G. DI CELLO - V. CURCIO

Relativamente poi alla costituzione interna, che appare sezionando centralmente il gambo, questa può essere **piena**, **cava**, **cavernosa**, **fistolosa**, **midolloso** ecc. La sua superficie può presentare anche ornamentazioni varie che nelle diverse specie fanno sì che esso appaia **reticolato**, **granuloso**, **scrobicolato** (con fossette), **liscio**, **fibrilloso**, ecc.



FOTO V. CURCIO

I VELI Nelle prime fasi di sviluppo diverse specie fungine possono presentare una membrana protettiva che li avvolge totalmente, **velo generale**, o che si estende nei funghi giovani, solo tra gambo e margine del cappello, **velo parziale**, ricoprendo la parte fertile del fungo a protezione dei tessuti che produrranno le spore (imenoforo). Con la crescita del fungo la lacerazione del velo generale può lasciare dei residui più o meno grossolani sia sul cappello (verruche, placche, fibrille, fioccosità) sia alla base del gambo: **volve**. Quest'ultima in base alla forma e consistenza potrà essere: **membranosa** e libera, formante quindi una sorta di sacchetto alla base del gambo (es. *A. phalloides*); **residuale** rappresentata da semplici residui costituenti **perle** o **verruche** che costituiscono dei cerchi concentrici sul gambo (es. *A. muscaria*); **circoncisa** alla base del gambo (*A. citrina*); **dissociata in anelli** (*A. pantherina*), ecc. In altri casi il velo generale può formare un rivestimento sul gambo, definito **armilla**, che lo inguaina come una **calza** e terminante in alto con un risvolto verso l'esterno simile ad un anello (es. *Cystoderma*).



FOTO E. MARRA - G. DI CELLO - V. CURCIO

L'ANELLO è il residuo del velo parziale che, come detto, da giovane protegge l'imenoforo e con la crescita, staccandosi dal margine del cappello, permane sul gambo. Per la sua conformazione l'anello può essere **semplice**, **ampio**, **doppio**, **membranoso**, **rudimentale**, **liscio**, **striato**, ecc. Una particolare costituzione del velo parziale, filamentosa o araneosa (simile a ragnatela) costituisce la **cortina** presente nel Genere *Cortinarius*.




FOTO E. MARRA - G. DI CELLO

LA CARNE È rappresentata dal tessuto che costituisce il cappello e il gambo. Per poterne valutare le caratteristiche occorre sezionare il fungo con un taglio che parte dal cappello verso il gambo in modo da dividerlo in due parti uguali. Della carne si valuta così:

- la **consistenza**, che può essere soda, compatta e asciutta come quella dei Boleti, gessosa e secernente un liquido lattiginoso come nei Lattari, gessosa ma asciutta come nelle Russule, molle, coriacea, fibrosa ecc.;
- il **colore**, che può essere stabile, come ad esempio nei *Boletus* gruppo edulis (porcini) la cui carne è bianca e immutabile, oppure cambiare di colore se esposta all'aria, come avviene per i funghi a carne virante ad es. *Boletus* gruppo luridus;
- l'**igrofaneità** cioè la capacità di variare il colore e la consistenza con l'assorbimento di acqua;
- la **quantità**, abbondante o esigua.



non virante



viraggio parziale



viraggio esteso

FOTO G. DI CELLO - E. MARRA

LE MODALITÀ DI SVILUPPO Anche il modo con cui si sviluppa un fungo può caratterizzare una specie. Rispetto a tale particolarità un fungo si dice: **cespitoso** se costituito da diversi esemplari con gambi fusi alla base, **fascicolato** se concesiuto in modo simile a un fascio con gambi uniti alla base solo per un breve tratto. Secondo il modo di crescita i funghi possono ancora essere: **solitari** quando crescono singolarmente, **gregari** quando più esemplari crescono vicini nello stesso luogo, **allineati** se crescono in fila, a **cerchio** se crescono a forma di cerchio ecc.



cespitoso



allineati



"cerchio delle streghe"

FOTO E. MARRA - A. DE MARCO - M. CARBONE

I caratteri organolettici

Il rilievo dei caratteri organolettici di un fungo (odore e sapore), pur essendo parametri soggettivi legati all'individuale sensibilità olfattiva e gustativa, in molti casi è un ulteriore ausilio per la determinazione di diverse specie.

Riguardo all'**odore**, si tratta di un carattere che in alcuni casi è sufficiente a consentire il riconoscimento perché evoca, in modo netto, altri odori noti. È il caso dell'odore di anice di *Clitocybe odora*, di pesce in *Lactarius volemus*, di zolfo in *Tricholoma sulfureum*, di putrefazione in *Phallus impudicus*, di farina in *Clitophilus prunulus*, di rapa in *Amanita citrina* ecc.

La classificazione secondo il colore della sporata: Sporotaxa

Per le loro dimensioni le singole spore dei funghi non sono visibili a occhio nudo, tuttavia, come già detto, lasciando per qualche ora un cappello del fungo maturo (privo del gambo) poggiato su un foglio di carta, è possibile ottenere facilmente la "sporata" o "impronta sporale" che deriva dal deposito in massa delle spore. Così facendo si può verificare che le spore hanno un colore proprio, che è evidenziabile facilmente solo quando le stesse si accumulano su una superficie.

La diversa colorazione dell'impronta sporale ha consentito, al botanico svedese Elias Magnus Fries nel 1821, di elaborare un metodo che ancora oggi è utilizzato per collocare i funghi in 5 grandi gruppi.


1. **LEUCOSPOREI**: con spore bianche, biancastre o crema;
2. **RODOSPOREI**: con spore rosa, rosa salmone;
3. **OCROSPOREI**: con spore ocra, bruno rugginoso;
4. **IANTINOSPOREI**: con spore porpora, bruno-porpora, bruno scuro, bruno-violaceo;
5. **MELANOSPOREI**: con spore nere.

Tale metodo, rappresenta un sistema di classificazione dei funghi, SPOROTAXA che consente il raggruppamento dei generi:

- **LEUCOSPOREI**: *Amanita*, *Armillaria*, *Cantharellus*, *Clitocybe*, *Collybia*, *Hygrocybe*, *Hygrophorus*, *Lactarius*, *Lentinus*, *Lepiota*, *Macrolepiota*, *Marasmius*, *Mycena*, *Pleurotus*, *Russula*, *Tricholoma*;
- **RODOSPOREI**: *Clitopilus*, *Entoloma*, *Pluteus*, *Volvariella*;
- **OCROSPOREI**: *Cortinarius*, *Hebeloma*, *Inocybe*, *Paxillus*, *Pholiota*;
- **IANTINOSPOREI**: *Agaricus*, *Hypholoma*, *Stropharia*;
- **MELANOSPOREI**: *Coprinus*, *Gomphidius*, *Panaeolus*, *Psilocybe*.



Leucosporei



Rodosporei



Ocrosporei



Iantinosporei



Melanosporei

Le condizioni ambientali



42

Affinché il micelio entri in attività vegetativa e produca il “corpo fruttifero” è necessario che si verifichino determinate condizioni favorevoli che prevedono un alto tasso di umidità e temperature ideali che oscillano da un minimo di 12°C (notturna) a un massimo di 25°C gradi (diurna).

Tali valori tuttavia possono variare di alcuni gradi a seconda della specie. Considerando infatti quale fattore essenziale l'ambiente caldo-umido, esistono in natura specie particolarmente termofile (amanti del caldo) che trovano le condizioni migliori per la fruttificazione in prossimità del limite più alto fra quelli indicati e specie che fruttificano più facilmente a temperature prossime al valore più basso. Limitandoci a considerare le specie più note fra i funghi commestibili, avremo così, ad esempio *Hygrophorus marzuolus* (marzaiolo), *Boletus pinophilus* (porcino dei pini), *Lactarius deliciosus* (rosito), *Tricholoma portentosum* (portentoso) la cui nascita è legata a temperature più fresche e altre quali *Boletus reticulatus* (porcino estivo), *Amanita caesarea* (ovulo buono), *Cantharellus cibarius* (galletto) la cui nascita normalmente è favorita da temperature più calde.

LA STAGIONALITÀ Per le particolari condizioni climatiche favorevoli della Calabria, esposta alle correnti calde e umide del mediterraneo, le nascite fungine potrebbero avvenire durante tutto il corso dell'anno, così come in realtà accade sempre più frequentemente. Condizioni climatiche permettendo però, l'abbondanza di nascite delle principali specie commestibili riconosce una sua stagionalità che consente, in Calabria, di reperire ad esempio:

- **specie primaverili** *Hygrophorus marzuolus* da fine febbraio ad aprile; *Calocybe gambosa* (prugnolo), *Morchella sp.* (spugnole), diverse specie di *Agaricus* (prataioli) in aprile-maggio ecc.

FOTO G. DI CELLO



Nel periodo primaverile deve essere posta particolare attenzione nella raccolta dei funghi con cappello bianco per la presenza di *Amanita verna*, specie tossica primaverile (da febbraio a giugno inoltrato) potenzialmente mortale e confondibile, per il raccoglitore poco attento, con gli *Agaricus* commestibili.

- **specie primaverili-estive:** *Boletus pinophilus*, *Boletus reticulatus*, *Boletus aereus* (porcini estivi), *Cantharellus cibarius* (galletto), diverse specie di *Russula* ecc.

- **specie estive-autunnali:** *Boletus edulis*, *Boletus reticulatus*, *Boletus aereus*, *Amanita caesarea*, *Macrolepiota procera*, *Hdnum rufescens*, *Hdnum repandum*, *Leccinum sp.*, tutte le specie di *Russula* ecc.

- **specie tardo autunnali:** *Boletus pinophilus*, *Lactarius deliciosus*, *Tricholoma portentosum*, *Pleurotus ostreatus*, *Craterellus cornucopioides*, *Cantharellus lutescens* ecc..

A crescita autunnale e tardo autunnale sono anche specie particolarmente pericolose perché potenzialmente mortali quali *Amanita phalloides*, *Amanita virosa*, *Cortinarius orellanus*, *Cortinarius rubellus*, diverse specie appartenenti al genere *Lepiota* e numerose altre specie tossiche. Tuttavia la stagionalità delle nascite fungine, in particolare per le specie estive ed autunnali, non è strettamente ancorata al periodo, poiché, essendo influenzata dalle condizioni climatiche, è anche legata all'altitudine. Accade così che in primavera (ad eccezione di *Hygrophorus marzuolus* che nasce a quote alte allo sciogliersi della neve), in condizioni ambientali favorevoli, le prime nascite avvengono a quote basse per poi, con l'aumento delle temperature, diminuire in tali località e iniziare a svilupparsi a quote superiori, prolungandosi in montagna (se le condizioni climatiche lo consentono) anche durante l'intera estate e raggiungendo il picco massimo nella stagione autunnale. Con l'inoltrarsi dell'autunno ed il diminuire delle temperature si ha l'inversione dell'andamento descritto: a quote alte le giornate fredde bloccheranno le nuove nascite e le stesse riprenderanno a quote sempre più basse fino a dicembre inoltrato nelle basse colline prospicienti il mare.

Amanita verna **potenzialmente mortale**

FOTO V. CURCIO

*Hygrophorus marzuolus*

FOTO V. CURCIO

*Agaricus urinascens*

FOTO A. CONTIN

43



È un tema sempre molto dibattuto fra i raccoglitori e sul quale, molto spesso, la fantasia popolare ha contribuito a creare un alone di “mistero” che tutt’oggi continua a trovare sostenitori.

In realtà, trattandosi di un fenomeno biologico, la nascita dei funghi è legata ad una concomitanza di eventi naturali che di “magico” hanno solo la casualità, il sincronismo del loro verificarsi ed il loro perdurare in equilibrio favorevole per un tempo sufficiente, evento effettivamente non sempre facile a verificarsi.

Fattori predisponenti Un alto grado di umidità favorito da pioggia intensa ma leggera, tale che non dilavi il terreno senza penetrarvi, prolungata per alcuni giorni e seguita da temperatura mite e stabile sia diurna che notturna, è la condizione ideale affinché il micelio, nel giro di pochi giorni, entri in tumultuosa fase vegetativa ed avvii la produzione fungina. Al verificarsi della coincidenza degli eventi indicati ed al loro permanere, le prime nascite possono così iniziare dopo circa dieci giorni dalle prime piogge significative.

Fattori limitanti Un brusco calo di temperatura quale un’escursione termica significativa tra la temperatura diurna e quella notturna, soprattutto se prolungata per più giorni, così come un innalzamento delle temperature oltre i 30°C in modo prolungato o una sola giornata di vento caldo, possono vanificare gli effetti benefici della pioggia prosciugando l’umidità ambientale e bloccando, di conseguenza, la fase riproduttiva del micelio che rientrerà in quiescenza fino al verificarsi di nuove condizioni favorevoli.

Credenze popolari È facile assistere a discussioni fra i cercatori circa la **velocità di crescita** di un fungo. Sono in molti, infatti, pur di non ammettere una svista, quelli che sostengono di aver visitato una stazione di crescita nel pomeriggio e di non aver trovato segni di nascite salvo poi ritornarci il mattino successivo e fare un discreto raccolto di grossi funghi. Da qui nasce la leggenda secondo la quale i funghi spunterebbero improvvisamente “già grandi”, nell’arco di tempo di una nottata. In realtà ciò non ha nessun fondamento perché è in contrasto con i principi basilari della biologia secondo i quali un organismo nasce, si accresce e muore in un arco di tempo proprio della specie di appartenenza, influenzabile da diverse variabili ma sicuramente non istantaneo. Volendo riportare un esempio relativo al più conosciuto dei funghi commestibili, il porcino in condizioni ottimali ambientali ha bisogno di circa 4-5 giorni per passare dalla dimensione di 1 cm a dimensioni di 10-15 cm.

Altro tema dibattuto che spesso fra i cercatori è motivo di accese e discordanti discussioni è l’**influenza delle fasi lunari** sulla nascita/crescita dei funghi. Anche in questo caso si tratta di una falsa credenza priva di fondamento scientifico, tant’è che le teorie relative al periodo favorevole sono diverse nelle diverse località e attribuite, di volta in volta, al primo quarto di luna (luna crescente) o al contrario, all’ultimo quarto di luna (luna calante).



A protezione del delicato ruolo che i funghi svolgono in natura la loro raccolta è regolata da norme nazionali (vedi in appendice) e regionali che per la Regione Calabria sono riportate nella **Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 30** e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Permessi e limiti quantitativi

La Legge Regionale prevede l’obbligo del possesso di permessi nominativi ai fini della raccolta e ne stabilisce i limiti quantitativi di prelievo giornaliero.

Tessera amatoriale

*Consente la raccolta, nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di **3 (tre) kg** giornalieri (elevato a 5 Kg per i residenti nei comuni montani). Per il rilascio la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo.*

Tessera professionale

*Consente la raccolta, nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di **10 (dieci) Kg** giornalieri. E’ rilasciata, previa presentazione di istanza, per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso formativo e del superamento dell’esame finale.*

Entrambe le tessere hanno validità di cinque anni solari, con obbligo di vidimazione annuale a cura dell’ente che l’ha emessa, a seguito di avvenuto pagamento dell’importo previsto per ciascun anno.

Tessera scientifica

Consente la raccolta esclusivamente per motivi di studio e ricerca..

PERMESSO MICOLOGICO TURISTICO

E’ riservato ai NON residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta intestata alla Regione. Consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale (massimo di 3 Kg giornalieri) e può avere la durata di 3, 7 o 30 giorni con costi differenti. Il periodo di utilizzo del permesso deve essere annotato nello spazio previsto per la causale di versamento pena la mancata validità.

Per il dettaglio relativo alla raccolta si rinvia ai contenuti della Legge Regionale n. 30/2001. Per le procedure relative al rilascio dei singoli permessi e alle modalità di pagamento delle somme dovute si rinvia alla consultazione del Portale Regione Calabria-Settore Agricoltura. Altresì potranno essere contattati gli Uffici comunali, della Provincia, di Calabria Verde, l’Ispettorato Micologico delle ASP o le Associazioni Micologiche presenti sul territorio.

! ricorda

46


La raccolta deve avvenire solo nelle ore diurne.

NO

E' vietato distruggere i funghi non commestibili di qualsiasi specie.



E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di "Ovolo chiuso".

NO**NO**

I funghi raccolti devono avere il diametro del cappello di almeno:

- *Amanita caesarea* (ovolo buono), cm 5 ;
- *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcini), cm 4;
- *Macrolepiota procera*, (mazza di tamburo), cm 10;
- *Agaricus campestris*, gruppo, (prataioli), cm 4 (quattro);
- *Russula virescens* e altre russule commestibili cm 4;
- *Clitocybe géotropia* (agarico geotropo), cm 4;

Per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3, fanno eccezione i funghi concresciuti in cui almeno uno deve avere le dimensioni previste.



La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici. È vietato raccogliere funghi, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione, nelle riserve naturali integrali e nelle aree protette regionali.

Attenzione al luogo di raccolta

Alcuni funghi hanno particolare capacità di concentrare alcuni contaminanti ambientali, per tale ragione è vietato raccogliergli se rinvenuti in prossimità di strade a traffico intenso, parchi cittadini e discariche, nonché in campi agricoli o sotto i frutteti per la possibile contaminazione con fitofarmaci usati in agricoltura.

Solo funghi sani e attenzione a ciò che si raccoglie

Non raccogliere funghi in avanzato stato di maturazione, inzuppati d'acqua o invasi da muffe. Raccogli solo i funghi di cui si è assolutamente certi della commestibilità. In alcuni casi la scarsa illuminazione del bosco o la fretta nella raccolta potrebbe indurre a fare confusione tra specie simili non commestibili o tossiche. Occorre tenere sempre presente che nel medesimo luogo di raccolta possono coesistere specie commestibili e tossiche.

47

I particolari possono fare la differenza

È importante raccogliere i funghi nella loro interezza praticando una torsione alla base del gambo e facendo attenzione a non lasciare infisso nel terreno parte di questo. Per essere correttamente identificati i funghi devono essere integri, ogni piccolo particolare che potrebbe sembrare insignificante per il raccoglitore, può essere indispensabile al Micologo per la corretta identificazione della specie. L'importanza di raccogliere funghi rispettando le dimensioni minime previste è legata a ragioni di tipo ecologico, ma anche ai fini del riconoscimento affinché siano evidenti tutti caratteri morfologici propri della specie. La pulizia sommaria, che la norma prevede debba avvenire sul posto, è da intendersi come riferita al solo allontanamento del terriccio e del fogliame.

Per la raccolta usa cestino e bastone

- È vietato usare uncini, rastrelli o altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino.
- I funghi devono essere sommariamente puliti sul posto e trasportati in contenitori forati rigidi.
- È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi.

Il trasporto dei funghi in contenitori rigidi e aerati è una condizione che garantisce l'integrità del fungo ed una migliore conservabilità. Se sottoposti a cattiva conservazione, anche per breve tempo, i funghi vanno precocemente incontro a fenomeni alterativi. Il trasporto in condizioni di cattiva aerazione, come avviene ad esempio con l'uso di sacchetti di plastica, determina ristagno di umidità e aumento della temperatura, innescando precocemente il processo di fermentazione che rende anche i funghi commestibili potenzialmente pericolosi per il consumatore.

La norma vieta espressamente l'uso di qualsiasi strumento atto a smuovere il terreno poiché tale pratica danneggia irreparabilmente il micelio compromettendo nuove nascite fungine.



Condivisione di **habitat**

È sempre bene ricordare che i funghi di diverse specie, commestibili e tossici, possono condividere il medesimo habitat e crescere anche a stretto contatto. Per tale motivo è necessario prestare molta attenzione a ciascun fungo che si aggiunge nel cestino. Inoltre nello stesso luogo di raccolta possono, crescere, nelle diverse annate, funghi appartenenti a specie diverse, anche molto tossiche, che possono essere confusi con i commestibili che normalmente sono raccolti in quel luogo.



Armillaria mellea (COMMESSIBILE) CONCRESCIUTO


CON *Hypholoma fasciculare* (TOSSICO)

FOTO E. MARRA



Hypholoma fasciculare TOSSICO

FOTO E. MARRA



Hypholoma fasciculare TOSSICO

FOTO E. MARRA

I funghi nell'Alimentazione

Per la capacità di conferire alle preparazioni alimentari il loro tipico aroma, i funghi sono largamente utilizzati in cucina e molto apprezzati non solo dai raccoglitori ma, più in generale, da una larga fascia di consumatori. Per molti, infatti, consumare una pietanza a base di funghi rappresenta una vera e propria "esperienza alimentare sensoriale" che soddisfa gli organi dell'olfatto e del gusto, tanto da farli ritenere un alimento "esclusivo". Senza entrare in merito circa l'attribuzione di proprietà benefiche e nutraceutiche legate al consumo di talune specie fungine, di seguito si riportano alcuni cenni sulla composizione dei funghi. Da un punto di vista strettamente nutrizionale hanno un apporto calorico molto basso (circa 26 Kcal/100 g), simile a quello degli ortaggi e delle verdure, infatti sono costituiti da un'alta percentuale di acqua, hanno un ridotto contenuto proteico, così come basso è l'apporto di lipidi e carboidrati. Il contenuto in fibra (rappresentata dalla chitina) è invece rilevante così come è apprezzabile la presenza di sali minerali Ferro, Calcio, Fosforo, Potassio e Sodio. Riguardo al contenuto in vitamine varia a seconda della specie attestando mediamente un utile apporto di vitamine del gruppo B e per alcune specie, anche di vitamina C. Facendo riferimento alle specie fungine diffusamente consumate (*Boletus edulis* e relativo gruppo) cento grammi di fungo crudo contengono*:

Acqua	Proteine	Lipidi	Carboidrati	Fibra	Ferro	Calcio	Fosforo	Potassio	Sodio
92 g	3,9 g	0,7 g	1 g	2,5 g	1,2 mg	22 mg	142 mg	235 mg	52 mg

* fonte INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione).

La gradevolezza per il palato dei funghi, tuttavia, non deve fare dimenticare che una corretta alimentazione prevede sempre un equilibrato bilanciamento delle sostanze nutritive che si assumono, senza eccedere nelle quantità riguardanti singoli alimenti. Tutto ciò ha un significato ancora più pressante nel caso dei funghi per le loro peculiari caratteristiche.

L'alto contenuto in chitina (polisaccaride indigeribile per l'uomo, lo stesso che costituisce l'esoscheletro dei crostacei) li rende, infatti, difficilmente digeribili, ancor più se preparati o consumati assieme a pietanze elaborate e proprio per questa caratteristica, se ne sconsiglia il consumo a chi soffre di difficoltà digestive, alle donne in stato di gravidanza, agli anziani e



FOTO E. MARRA

in modo particolare, ai bambini. Inoltre la capacità di alcune specie fungine di bioaccumulare alcuni metalli pesanti, soprattutto in situazioni di contaminazione ambientale (quali ad esempio cesio in *Cantharellus cibarius*, piombo nel genere *Agaricus*, rame in *Macrolepiota procera*, *Cantharellus cornucopioides* e *Hydnum repandum*, zinco in *Boletus edulis*), inducono a una moderata assunzione in termini quantitativi e comunque non in pasti ravvicinati.

Infine deve essere tenuto conto, dell'eventuale intolleranza alimentare individuale, segnalata dalla casistica clinica, che in alcuni soggetti può scatenare, per cause non ancora perfettamente conosciute, effetti indesiderati rilevanti anche in caso di consumo dei più comuni funghi commestibili, in particolar modo se consumati crudi.

RICORDA

- Molte specie tossiche non risentono affatto dell'azione del calore e anche la cottura prolungata non ne modifica la tossicità o velenosità. E' questo il caso di molti dei funghi più pericolosi, compresi quelli potenzialmente mortali, che contengono tossine capaci di resistere al calore (termostabili). Analogamente il processo di essiccazione mantiene inalterata nel tempo anche la tossicità di molte delle più pericolose specie.
- NON fidarsi di consigli sulla commestibilità di presunti "esperti" o conoscitori.
- NON consumare funghi "incerti" sulla base di confronti con foto o descrizioni reperite su internet, riviste o libri; le descrizioni potrebbero essere male interpretate dai non esperti.
- NON regalare o accettare come dono funghi non certificati dal Micologo. L'eventuale intossicazione causata da tali funghi, oltre a recare danni alle persone, potrebbe far configurare conseguenze anche penali per chi li ha ceduti.
- I funghi vanno consumati ben cotti. I casi segnalati di episodi di reazioni avverse, legati con ogni probabilità a intolleranza individuale, sconsigliano il consumo di funghi crudi.

FOTO E.MARRA



Le principali regole per il consumo

I funghi sono considerati un alimento prelibato ma la loro preparazione deve seguire regole precise.

1. Prima pulizia nel bosco

Per diminuire la contaminazione durante il trasporto, i funghi devono essere ripuliti sommariamente (da terriccio e fogliame) prima di essere riposti nel cesto, nel quale andranno posati con il cappello verso il basso in modo da favorire la migrazione verso l'alto delle larve eventualmente presenti preservando il cappello che è la parte più pregiata.

2. Controllo di commestibilità

Sottoporre l'intero raccolto al controllo di commestibilità del Micologo dell'ASP.

3. Pulizia a casa

Nascendo spesso a stretto contatto con il terreno tutti i funghi possono portarsi dietro i contaminanti batterici del suolo, per questo motivo è necessario ultimare la pulizia raschiando accuratamente, con un coltellino, ciascun fungo da ogni residuo e completare la pulizia del gambo e del cappello con un panno umido.

Sciacquare velocemente i funghi giovani e sodi sotto acqua corrente solo se si procede alla loro cottura immediata. Incidere gambo e cappello, anche degli esemplari piccoli, per controllare lo stato di conservazione della carne ed escludere l'eventuale presenza di larve.

FOTO E.MARRA



4. Essiccazione

Puliti i funghi accuratamente, senza lavarli, affettarli e lasciarli essiccare su graticcio al sole, in essiccatoio o in forno ventilato a 30° con sportello semiaperto. Conservare in sacchetti di tela in un luogo asciutto o congelarli in contenitore ermetico per alimenti.

FOTO E.MARRA



5. Conservazione mediante il freddo

I funghi freschi vanno conservati refrigerati per tempi limitati in rapporto alla qualità della raccolta. Per il **congelamento** saranno scelti esemplari giovani con carne soda, privi di larve, puliti ma non lavati, tagliati secondo le necessità, congelati in sacchetti per alimenti e consumati entro 6/8 mesi. Altro procedimento prevede la sbollentatura, per pochi minuti in poca acqua (senza olio) e il successivo congelamento, con la stessa acqua di vegetazione, in vaschette per alimenti. Occorre ricordare che nel caso di *Armillaria mellea* (chiodino), è indispensabile procedere prima del congelamento, alla preventiva sbollentatura, (almeno 15 minuti) eliminando l'acqua utilizzata. Il congelamento da fresco favorisce la formazione di composti tossici stabili, non eliminabili dalla successiva sbollentatura e cottura. Per lo stesso motivo occorre evitare la raccolta di *A. mellea* quando possa aver subito anche un parziale congelamento in natura. È da evitare il congelamento casalingo di *Cantharellus cibarius* da crudo che spesso, per cause non conosciute, rende amara la preparazione.

Attenzione alle false credenze

NON è vero

che l'aglio, il prezzemolo o le posate d'argento anneriscono durante la cottura dei funghi tossici. In un grave caso di avvelenamento falloideo, avvenuto a Cosenza nel 2013, la vittima aveva fatto affidamento proprio su tale pericolosissima credenza ed ha rischiato la vita per il consumo di *Amanita phalloides*.



FOTO E. MARRA



O. olearius / tossico su legno FOTO G. DI CELLO

NON è vero

che tutti i funghi che crescono sul legno sono commestibili.

NON è vero

che i funghi rosicchiati dalle lumache sono sicuramente commestibili.



A. verna tossico rosicchiato FOTO G. DI CELLO

E' falso

oltre che crudele, far consumare funghi dubbi agli animali, cane o gatto, per verificarne la loro commestibilità. Gli animali, rispetto alle diverse sostanze tossiche, hanno una sensibilità diversa, o tempi di risposta diversi da quelli dell'uomo.



IL SOLO METODO PER AVERE LA CERTEZZA DI CIO' CHE SI METTE NEL PROPRIO PIATTO, IN QUELLO DEI FAMILIARI O DEGLI AMICI, E' QUELLO DI FAR CONTROLLARE I FUNGHI RACCOLTI AI MICOLOGI DELLE ASP PRIMA DEL CONSUMO O PRIMA DI REGALARLI AD ALTRI.

IL CONTROLLO E' GRATUITO

La conservazione domestica e il rischio Botulismo



Uno dei metodi più utilizzati per la conservazione dei funghi in ambito domestico è quello sott'olio, spesso legato alle tradizioni e alla volontà di disporre tutto l'anno del prelibato alimento. Tuttavia tale metodo di conservazione, può esporre al rischio "botulismo alimentare", una grave intossicazione alimentare. Un'altissima percentuale dei casi di botulismo registrati ogni anno in Italia ha, infatti, come causa il consumo di conserve preparate in casa, in particolare **vegetali in acqua e sott'olio**.

Il Botulismo

Il Botulismo è una grave intossicazione causata dalla presenza nell'alimento delle tossine prodotte da *Clostridium botulinum*, un batterio che vive nel suolo e che produce spore (resistenti nell'ambiente esterno anche per un lungo periodo) capaci di contaminare prodotti vegetali e funghi. La produzione delle tossine, tra le più pericolose conosciute (con dose letale bassissima stimata in ng/Kg), è associata alla crescita del microrganismo che, durante la fase di conservazione degli alimenti non sufficientemente acidi, in presenza di acqua, in assenza di ossigeno e a temperatura ambiente, passa dallo stato sporale a quello vegetativo producendo, proprio in tale passaggio, la tossina. Gli alimenti, pur contaminati, possono non presentare segni di alterazione e per tale motivo capita che siano consumati inconsapevolmente. I principali sintomi, che insorgono in media dopo 12-48 ore dall'ingestione, sono di tipo neurologico, con annebbiamento e sdoppiamento della vista, secchezza della bocca, difficoltà nella deglutizione e nel linguaggio, debolezza muscolare, fino ad arrivare a paralisi dei muscoli respiratori e arresto cardiaco. In generale, tutti gli alimenti conservati non cotti e poco acidi (con pH superiore a 4,6) sono a rischio. Le norme precauzionali, utili a

prevenire l'intossicazione, prevedono la stretta osservanza delle basilari norme igieniche già nelle fasi di preparazione: accurato lavaggio dei funghi, degli utensili, dei piani di lavoro e dei contenitori in modo da allontanare l'eventuale presenza del batterio e delle sue spore.

La corretta preparazione delle conserve sott'olio

Dopo la scelta (solo esemplari sani e sodi) la pulizia e l'accurato lavaggio sotto acqua corrente, i funghi vengono frazionati e bollentati per alcuni minuti in una soluzione salata di ½ di aceto di vino bianco e ½ di acqua (o vino bianco) addizionata degli aromi e delle spezie. Dopo averli scolati e lasciati asciugare, i funghi vengono posti in vasetti di vetro, preventivamente sterilizzati e ricoperti di olio. I barattoli vengono quindi ermeticamente chiusi, immersi in una pentola con acqua e sottoposti ad ebollizione (pastorizzazione) per un tempo variabile a seconda della loro grandezza. Tale trattamento casalingo, tuttavia, poiché non permette di raggiungere le temperature di una vera sterilizzazione (garantita solo da apparecchiature industriali) può consentire la possibile sopravvivenza delle resistentissime spore di *Clostridium botulinum*, eventualmente presenti.

FOTO R. CAPANO



Per contrastare la produzione della tossina botulinica è indispensabile pertanto ottenere una buona acidificazione delle conserve, utilizzando **aceto di buona qualità** e con un grado di acidità almeno del 6% (negli aceti posti in commercio tale valore è riportato in etichetta), evitando l'uso di aceti casalinghi per i quali è sconosciuta l'acidità. Anche le **spezie e gli aromi** possono essere vettori di contaminazione botulinica, è importante quindi che questi vengano aggiunti fin dall'inizio e sottoposti alla sbollentatura acidificante assieme ai funghi. La giusta quantità di aceto e di sale, una buona pastorizzazione e la successiva conservazione dei barattoli in frigo consentono di ottenere conserve sufficientemente sicure e di buona conservabilità. Ai fini preventivi è utile altresì ricordare che, mentre le spore di *C. botulinum* sono resistentissime al calore, al contrario la tossina prodotta è termolabile (resa inattiva dall'azione del calore). Nel caso delle conserve sott'olio, pertanto, come eventuale ulteriore misura precauzionale, è opportuno, prima del consumo, porre il barattolo in acqua e attendere almeno 10 minuti dall'inizio dell'ebollizione per rendere inattiva l'eventuale tossina contenuta.

Come misurare l'acidità

Una metodica abbastanza semplice, utilizzabile in ambito domestico per verificare l'acidificazione delle conserve, prevede l'utilizzo delle "cartine al tornasole", reperibili in farmacia, che ne permettono di misurare il pH. La misura il grado di acidità/alcalinità (pH) viene espresso mediante una scala numerica con valori che vanno da zero a quattordici (0= molto acido, 7= neutro, 14= molto basico o molto alcalino). Affinché la conserva possa essere protetta dallo sviluppo del *Clostridium botulinum* la stessa deve raggiungere un valore di pH 4 o inferiore. Le cartine al tornasole a contatto con la frazione acquosa della conserva da misurare, cambiano visibilmente di colore, a seconda della sua acidità o della sua alcalinità, assumendo colorazione che vanno dal rosso = molto acido, al verde = neutro, fino al blu = molto basico (molto alcalino). Il confronto della cartina che ha mutato il suo colore con la tavola di colori, fornita con la confezione, permette di avere una buona indicazione del valore del pH della conserva. La misura viene effettuata ponendo a contatto

la cartina con il prodotto da valutare dal quale è stato allontanato l'olio. Occorre ricordare che poiché tali cartine contengono sostanze chimiche il loro utilizzo dovrà essere eseguito su una porzione di conserva che sarà poi eliminata. Per l'esatta procedura da eseguire si invita alla consultazione delle linee guida presenti sul sito del Ministero della Salute.



ATTENZIONE

La preparazione domestica di queste conserve è estremamente delicata e può non essere sufficiente a mettere al riparo dal rischio botulismo. Per un approfondimento consultare le Linee Guida presenti sul sito del Ministero della Salute.

La commercializzazione e le regole per gli OSA (Operatori del Settore Alimentare)

La vendita dei funghi epigei (di superficie) spontanei è soggetta a condizioni diverse a seconda se si tratti di **funghi freschi, secchi o altrimenti conservati** (congelati, surgelati, preparati sott'olio, sott'aceto, in salamoia ecc.).

Le regole per la vendita dei funghi freschi spontanei

Le specie fungine fresche spontanee che possono essere messe in commercio sul territorio nazionale sono quelle riportate in una **lista positiva**, (art. 4 DPR 376/95, OM 20 agosto 2002). La Regione Calabria ha integrato tale lista con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito regionale (L.R. 26 novembre 2001, n. 30, All. C). È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi provenienti da altri Paesi, purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine e accompagnate da una certificazione di commestibilità rilasciata dalle competenti autorità dello stesso Paese nonché dall'attestazione di avvenuto controllo di riconoscimento di commestibilità, dell'Ispettorato Micologico dell'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) competente territorialmente. In ogni caso, tutto il prodotto fresco in vendita deve essere obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario e certificato dall'Ispettorato Micologico.

- **SCIA** La vendita di funghi freschi spontanei, per la quale in passato era previsto il preventivo rilascio dell'autorizzazione comunale (DPR n. 376/1995 e Legge Regionale n. 30/2001), è oggi consentita dopo presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove ha sede l'attività produttiva che si intende avviare. Sarà cura del SUAP provvedere alla trasmissione degli atti alla competente ASP, ai fini della notifica sanitaria prevista dall'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004.
- **ATTESTATO D'IDONEITÀ AL RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZATE** La SCIA può essere presentata solo da coloro che sono in possesso dell'*Attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine commercializzate* (art. 7 comma 3 L.R. 30/2001 e DCA n. 106/2014). Tale attestazione è rilasciata dalle ASP a seguito d'istanza degli interessati e previo superamento di apposito esame, volto ad accertare l'effettiva capacità di riconoscimento delle specie fungine che si intendono commercializzare. Al fine di formare l'OSA, (Operatore del Settore Alimentare) in tal senso, le AA.SS.PP. periodicamente organizzano dei corsi specifici a cui è possibile partecipare previa istanza da presentare presso il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) a cui, in ciascuna ASP, afferiscono gli Ispettorati Micologici. L'attestato è prerequisito per l'attività di vendita, preparazione e somministrazione di funghi freschi spontanei. (In appendice è riportato il fac-simile dell'istanza per il rilascio dell'attestato, da inoltrare all'ASP competente, SIAN - Ispettorato Micologico).



Esposizione per la vendita

I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:

- suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
- contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
- disposti in singolo strato e non pressati;
- integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
- freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

Sulle cassette/contenitori di funghi destinati al consumatore, deve essere presente la certificazione dell'Ispettorato Micologico, che ne attesta la commestibilità e la commerciabilità. Se tale certificazione non dovesse essere esposta è possibile richiedere all'Operatore del Settore Alimentare l'esibizione di tale certificazione obbligatoria e l'eventuale mancanza potrà essere segnalata agli Organi di Controllo.

I funghi non possono essere commercializzati in forma itinerante/ambulante.

La certificazione sanitaria/di commestibilità, ai sensi L.R. n.30/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- generalità e residenza del venditore;
- specie e quantità posta in vendita;
- data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

In appendice è riportato il fac-simile di certificazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 752/2010.

La vendita dei funghi freschi coltivati

La vendita dei funghi freschi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli (DPR 376/95, art. 2), pertanto non sono previsti obblighi particolari per la vendita e non è necessaria la certificazione di commestibilità del Micologo dell'ASP.



La vendita dei funghi secchi o conservati

Possono essere messi in commercio i funghi secchi e i funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati, elencati nel DPR 376/95. Alle specie previste si possono aggiungere specie importate da altri Paesi, purché riconosciute commestibili nei Paesi di provenienza. I funghi secchi non possono essere venduti allo stato sfuso, fatta eccezione per i soli funghi "porcini" (*Boletus edulis* e relativo gruppo) la cui vendita allo stato sfuso è consentita. Per il confezionamento è obbligatoria l'osservanza delle norme di carattere generale relative all'etichettatura, nonché di quelle specifiche previste dal DPR 376/95.



Le responsabilità dell'OSA

Indipendentemente dalla specifica regolamentazione in materia di funghi, si deve ricordare che le norme comunitarie vigenti hanno statuito che spetta agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti (e quindi anche i funghi) soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare. Tale legislazione si applica a tutte le fasi della catena alimentare, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita ed è necessario garantire la sicurezza e la rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la catena, a cominciare dalla produzione primaria che, nel caso dei funghi, coincide con la fase di raccolta per i funghi spontanei o di coltivazione per quelli coltivati.



Le principali specie commestibili e commercializzabili

nome popolare: "porcino di faggio"

Boletus edulis

58



FOTO A. DE MARCO

Cappello: carnoso, bruno tipicamente più chiaro al margine; superficie rugosa, umida e viscosa. **Imenio:** tubuli e pori, bianchi da giovane poi giallastri, verdi a maturità. **Gambo:** pieno, sodo, ingrossato alla base, con reticolo in rilievo poco più chiaro dello sfondo. **Carne:** bianca che non cambia di colore, soda, compatta anche a maturità con odore fungino. **Habitat:** è un fungo simbiote nei boschi di latifoglie (querce, castagni, faggi) e conifere in estate autunno. **Commestibilità:** ottimo commestibile e commercializzabile su tutto il territorio nazionale, molto apprezzato per la compattezza della carne (DPR n. 376/95).



FOTO A. DE MARCO



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

nome popolare: "porcino estivo"

Boletus reticulatus (*Boletus aestivalis*)



FOTO G. DI CELLO

Cappello: cuticola asciutta, vellutata da nocciola a bruno scuro screpolata con il tempo secco. **Imenio:** tubuli e pori, biancastri da giovane, giallo-olivastri a maturità, che non cambiano di colore, separabili dal cappello. **Gambo:** obeso da giovane poi cilindrico, nocciola chiaro con reticolo da bianco a bruno. **Carne:** bianca che non cambia di colore, soda da giovane poi molle. Odore intenso fungino. **Habitat:** simbiote di latifoglie dalla primavera all'autunno nei boschi termofili. **Commestibilità:** ottimo commestibile, dal profumo intenso, ma con carne presto molle. Commercializzabile su tutto il territorio nazionale.

Possibile confusione con *Tylopilus felleus* (non commestibile) che ha carne intensamente amara, di colore bianco porcellana, pori rosati che alla pressione cambiano di colore verso il rosa intenso e gambo con reticolo marcato a maglie larghe.



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

59

Boletus aereus



FOTO A. DE MARCO

Cappello: emisferico, poi convesso, infine aperto, sodo, col tempo più morbido, colore da giovane bruno scuro, con vaste zone irregolari e superficie vellutata. **Imenio:** tubuli bianchi o giallognoli, pori piccoli, inizialmente biancastri poi giallo-verdastri, immutabili di colore. **Gambo:** robusto, dapprima obeso poi cilindrico, chiaro, poi brunastro, con sottile reticolo dello stesso colore dello sfondo nella parte alta. **Carne:** bianca, compatta anche a maturità, immutabile, odore fungino intenso e aromatico. **Habitat:** predilige l'ambiente tipicamente mediterraneo, dall'inizio dell'estate fino all'autunno. Simbionte di latifolia, particolarmente quercia, castagno e macchia mediterranea. **Commestibilità:** ottimo commestibile, è una specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale.

Possibile confusione con *Suillus cavipes* (*Boletinus cavipes*) non commestibile, più piccolo e con pori esagonali e gambo cavo a maturità.



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. DE MARCO



FOTO E. MARRA

Boletus pinophilus



FOTO G. DI CELLO

Cappello: carnoso, bruno-rossiccio con cuticola umida, grinzosa e ricoperda da una sottile pruina bianca. **Imenio:** tubuli e pori prima bianchi poi crema e infine giallo-olivastri, che non cambiano di colore. **Gambo:** obeso, duro, con reticolo evidente fino quasi alla base, da bianco a bruno-rossastro. **Carne:** soda da giovane poi più molle, bianca o appena giallastra, immutabile, con caratteristica pigmentazione rossa sotto la cuticola del cappello, odore fungino. **Habitat:** simbionte nei boschi di conifere e latifolia, la sua presenza è solitamente legata ai mesi più freschi, dalla primavera all'autunno inoltrato. **Commestibilità:** buon commestibile ma ritenuto, da alcuni, il meno pregiato del suo gruppo. Specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale.



FOTO V. CURCIO



FOTO A. DE MARCO



FOTO G. DI CELLO

Butyriboletus regius (*Boletus regius*)



FOTO G. DI CELLO

Cappello: carnoso, prima emisferico, poi guancialiforme. Cuticola asciutta, secca e grinzosa, spesso screpolata. Colore da rosa a rosso lampone, a volte violaceo, più chiaro con l'età e il secco. **Imenio:** tubuli e pori giallo-oro, poi olivastri per la maturazione delle spore. **Gambo:** corto e tozzo, cilindrico, ingrossato alla base, di colore giallo vivo con base macchiata di rosso porpora, ricoperto nella metà superiore da un fine reticolo giallo. **Carne:** gialla, sotto la cuticola rossastra, soda, dura, generalmente non virante al taglio e rosata sul fondo del gambo; odore leggermente fruttato, sapore gradevole. **Habitat:** nei boschi umidi mediterranei, dall'estate all'autunno, simbiote di latifoglie. **Commestibilità:** commestibile, da scartare per il consumo il gambo perché tenace in particolare negli esemplari adulti. Specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale. **Possibile confusione** con *Suillellus pulchrotinctus* (*Boletus pulchrotinctus*) tossico, che ha cappello rosa ciclamino più chiaro ai bordi, gambo sfumato di rosa/rosso con reticolo dello stesso colore e pori dapprima gialli poi aranciati.




FOTO G. DI CELLO



FOTO E. MARRA



FOTO V. CURCIO

Leccinellum lepidum (*Leccinum lepidum*)



FOTO E. MARRA

Cappello: da giovane sodo poi molle. Superficie rugosa e bitorzoluta, vischiosa a tempo umido, liscia con il secco. Colore da giallo bruno a bruno scuro. **Imenio:** tubuli lunghi, giallo limone, pori gialli poi grigiastri che si macchiano di grigio brunastro con la manipolazione. **Gambo:** cilindrico, pieno, fibroso, ingrossato alla base o sinuoso, giallo citrino, poi giallo scuro, bruno rossastro al tocco, brunastro alla base, cosparso da fini squamette concolori con lo sfondo, poi imbrunenti. **Carne:** inizialmente soda ma presto molle, fibrosa nel gambo, bianco-giallognolo, al taglio vira lentamente al rosa-rossastro, poi decolora al grigio-ocra, odore gradevole. **Habitat:** tipico dei boschi caldi mediterranei simbiote di querce, autunnale o tardo autunnale. **Commestibilità:** commestibile ma solo esemplari non troppo maturi di cui, in ogni caso, deve essere eliminato il gambo non commestibile perché duro e fibroso. Tutte le specie appartenenti al genere *Leccinellum* sono commestibili e commercializzabili su tutto il territorio nazionale.



Leccinellum sp



Leccinellum sp



Leccinellum sp

FOTO A. DE MARCO

FOTO A. DE MARCO

FOTO A. DE MARCO

Suillus luteus



FOTO G. DI CELLO

Cappello: emisferico poi aperto, superficie liscia, viscosa in particolare se umida, cuticola separabile di colore bruno con tonalità variabili. **Imenio:** tubuli lunghi e gialli, pori piccoli, giallo chiaro che tendono a inverdire a maturità. **Gambo:** pieno e sodo, bianco giallastro con evidente anello membranoso, vischioso, biancastro con aree di tonalità bruno-violaceo. **Carne:** consistente solo da giovane in seguito molle particolarmente nel cappello, chiara, tendente a scurire. **Habitat:** specie simbiote di pino, tardo estiva autunnale, gregaria e molto abbondante nelle stazioni di crescita. **Commestibilità:** specie commestibile ma solo gli esemplari molto giovani e previa asportazione del gambo e della cuticola vischiosa del cappello. Specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale.



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. BINCOLETTA

Suillus granulatus



FOTO B. RECCHIA

Cappello: sodo, carnoso con cuticola generalmente di colore bruno rossiccia/rugginosa ma con tonalità anche chiare, facilmente asportabile e particolarmente viscosa a tempo umido. **Imenio:** tubuli corti di colore giallastro, pori piccoli, inizialmente giallo intenso a maturità con riflessi verdastri, secernenti minute goccioline lattiginose. **Gambo:** giallo chiaro e cilindrico con un aspetto granuloso bruno dovuto al deposito secco delle goccioline secrete dai tubuli. **Carne:** gialla, inizialmente soda che diventa presto molle e facilmente inzuppata d'acqua, di sapore dolciastro. **Habitat:** simbiote di pino a crescita gregaria. **Commestibilità:** discretamente apprezzato ma solo esemplari giovani e sodi e dopo completa asportazione della cuticola ed eliminazione del gambo. Specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale.

In soggetti sensibili sono segnalati effetti lassativi anche significativi.



FOTO B. RECCHIA



FOTO B. RECCHIA



FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Boletus aereus

FOTO V. CURCIO



Boletus reticulatus (aestivalis)

FOTO G. DI CELLO



Butyriboletus regius

FOTO A. DE MARCO

SPECIE NON COMMESTIBILE/TOSSICA



Gyroporus castaneus

FOTO V. CURCIO



Tylopilus felleus

FOTO G. DI CELLO




Rubroboletus pulchrotinctus

FOTO M. CARBONE

Principali differenze. *Gyroporus castaneus*: piccole dimensioni, gambo liscio, friabile e presto cavo al suo interno. *Tylopilus felleus*: tubuli e pori viranti al rosa, carne amara, reticolo sul gambo a maglie allungate in rilievo. *Rubroboletus pulchrotinctus*: cappello chiaro al centro e rosato fino al rosa ciclamino al margine, pori inizialmente gialli poi aranciati e viranti all'azzurro al tocco, gambo con tonalità rosate nella zona intermedia, in sezione carne virante all'azzurro nel cappello e nella parte alta del gambo, odore sgradevole a maturità. È specie responsabile di sindrome gastrointestinale.

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Boletus reticulatus

FOTO V. CURCIO



Boletus reticulatus


FOTO G. DI CELLO



Boletus pinophilus

FOTO V. CURCIO

SPECIE NON COMMESTIBILE/TOSSICA



Caloboletus radicans

FOTO A. DE MARCO



Rubroboletus satanas

FOTO A. DE MARCO



Caloboletus calopus

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze. *Caloboletus radicans*: cappello chiaro, pori viranti al tocco, giallo intenso poi verdognoli, carne molto amara e virante, odore chimico (di inchiostro) gambo radicante. *Rubroboletus satanas*: cappello chiaro, tubuli gialli poi verdognoli, pori inizialmente gialli poi rosso/arancio viranti al blu alla pressione, gambo giallo nella parte superiore, rosso intenso violaceo nella parte centrale, giallo rossastro alla base, carne virante al taglio, odore sgradevole, responsabile di sindrome gastrointestinale. *Caloboletus calopus*: cappello grigiastro, pori gialli poi verdognoli, viranti al tatto, gambo con colorazione rossastra vistosa ed estesa, che sfuma al giallo nella parte alta, carne amara con odore chimico.

nome popolare: "ovolo buono"

Amanita caesarea



FOTO A. DE MARCO

Cappello: da giovanissimo racchiuso nel velo generale bianco, inizialmente sferico, poi ovoidale, infine aperto. Margine striato, colore arancio più o meno carico; cuticola leggermente viscosa a tempo umido, brillante a secco, con qualche placca bianca residuo del velo generale. **Lamelle:** giallo dorate, fitte, con lamellule. **Gambo:** carnoso, nettamente giallo dorato. **Anello:** ampio, cascante, membranoso, striato, di colore giallo intenso simile al gambo e alle lamelle. **Volva:** bianca, membranosa, liscia, ampia e persistente che risale sul gambo a sacchetto. **Carne:** bianca, tenera, gialla sotto la cuticola del cappello, odore mite e gradevole. **Habitat:** specie simbiote, in estate e autunno nei boschi termofili mediterranei caldi e umidi di latifoglie, in particolare sotto castagni e querce. **Commestibilità:** eccellente commestibile e molto ricercato. Specie commercializzabile su tutto il territorio nazionale. **Nello stadio di primordio (ovolo chiuso), è vietata la raccolta per la possibile confusione con primordio di *Amanita phalloides*, specie potenzialmente mortale.**




FOTO G. DI CELLO



FOTO A. DE MARCO





FOTO A. DE MARCO


POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Amanita caesarea

FOTO V. CURCIO



Amanita caesarea

FOTO G. DI CELLO



A.caesarea- sezione ovolo chiuso

FOTO V. CURCIO

SPECIE TOSSICA



Amanita muscaria

FOTO A. DE MARCO



Amanita muscaria f. aureola

FOTO A. BINCOLETTO



A.phalloides-sezione ovolo chiuso

FOTO A. DE MARCO

Principali differenze: *Amanita muscaria* ha cappello rosso con presenza di residui del velo generale rappresentati da minute verruche bianche piramidali. Lamelle, gambo e anello di colore bianco. Gambo con base nettamente ingrossata, bulbosa, con volva dissociata in minuscole verruche bianche. *Amanita muscaria f. aureola* può avere cappello con colorazione molto simile ad *Amanita caesarea*, a volte anche privo di verruche bianche, ma ha sempre lamelle, anello e gambo bianchi.

L'ovolo di *Amanita phalloides* in sezione è privo di colorazione gialla nel cappello e nel gambo.

Macrolepiota procera



FOTO A. CONTIN

Cappello: inizialmente quasi sferico, poi aperto; di colore brunastro, bruno-grigio e con umbone liscio bruno scuro al centro; cuticola desquamata in scaglie irregolari più scure e fibrillose. **Lamelle:** fitte, irregolari; bianco giallastre, tendenti a bruno-rossastro a maturità. **Gambo:** lungo, cilindrico, cavo, fibroso, con superficie bruna ma screziata più chiara (zebrata), bulboso alla base. Anello vistoso, doppio, con margine fioccoso e scorrevole sul gambo. **Carne:** poco consistente, tenera nel cappello, fibrosa nel gambo, bianca, che diventa appena rossastra all'aria. Odore e sapore di nocciola. **Habitat:** fungo saprofita rinvenibile nelle radure erbose e nei boschi aperti in estate-autunno, spesso presente in più esemplari nello stesso luogo. **Commestibilità:** ottimo commestibile e commercializzabile, si consuma solo cappello, scartando il gambo a causa della sua fibrosità. La norma prevede che tale specie per poter essere raccolta, debba avere dimensione minima del cappello non inferiore a 10 cm e questo anche per evitare la **possibile confusione** con il genere *Lepiota* che annovera specie tossiche potenzialmente mortali. **Possibile confusione** con *Chlorophyllum molybdites*, specie di origine esotica tossica comparsa anche in Calabria, che si distingue per avere lamelle grigio verdastre a maturità.



FOTO V. CURCIO



FOTO G. DI CELLO



FOTO E. MARRA

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Macrolepiota procera

FOTO E. MARRA



Macrolepiota procera

FOTO A. CONTIN



Macrolepiota procera

FOTO G. DI CELLO

SPECIE TOSSICA



Lepiota brunneoincarnata **potenzialmente mortale** FOTO E. MARRA



Chlorophyllum molybdites

FOTO E. MARRA



Chlorophyllum rhacodes

FOTO A. BINCOLETTA

Principali differenze: Genere *Lepiota*, taglia decisamente più ridotta. *Chlorophyllum molybdites*, specie non frequente ma segnalata in Calabria nelle zone litoranee dove è stata causa di episodi di intossicazione. Ha lamelle crema verdognole, a maturità grigio-verdi. *Chlorophyllum rhacodes* (*Macrolepiota rachodes*) ha gambo liscio e carne arrossante, facilmente evidenziabile scarificando il gambo.

Lactarius deliciosus



FOTO M. CARBONE

Cappello: carnosso, convesso, a maturazione più appianato ma sempre depresso al centro, margine involuto; superficie viscosa a tempo umido, di colore rosso-arancio con cerchi concentrici (zonato), che si macchia facilmente di verde. **Lamelle:** fitte, strette, decorrenti sul gambo; di colore arancio, che si macchiano di verdi alla frattura o alla contusione. **Gambo:** cilindrico, cavo; arancio più chiaro rispetto al cappello, con fossette disseminate (scrobicoli). **Carne:** soda, più chiara internamente ma rosso-carota sotto la superficie, virante al verdastro alla contusione e al taglio, odore gradevolmente resinoso. **Lattice:** color carota che all'aria vira al verde. **Habitat:** da fine estate ad autunno inoltrato sotto pino di cui è simbiote. Solitamente abbastanza gregario nelle stazioni di crescita. **Commestibilità:** commestibile e commercializzabile, molto ricercato per la conservazione.

Del genere *Lactarius* con lattice color carota o rossastro, fanno parte altre specie, tutte commestibili e commercializzabili in Calabria: *L. sanguifluus*, *L. semisanguifluus* e *L. salmonicolor*. Quest'ultimo, simbiote stretto dell'abete bianco ha carne che, a differenza delle specie vicine, non invertisce.



Lactarius sanguifluus FOTO V. CURCIO



L. semisanguifluus

FOTO G. DI CELLO




Lactarius salmonicolor

FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Lactarius deliciosus lattice carota

FOTO G. DI CELLO



Lactarius deliciosus

FOTO A. DE MARCO



Lactarius salmonicolor

FOTO V. CURCIO

SPECIE NON COMMESTIBILE/TOSSICA



Lactarius chrysorrheus lattice giallo

FOTO E. MARRA



Lactarius scrobiculatus

FOTO M. CARBONE



Lactarius torminosus tossico

FOTO M. CARBONE

Principali differenze: *Lactarius chrysorrheus* (non commestibile) ha gambo e lamelle inizialmente bianche poi giallo aranciate chiaro e lattice prima bianco poi giallo. *Lactarius scrobiculatus* ha cappello giallo arancio, lamelle crema chiaro, lattice inizialmente bianco poi giallo zolfo, crescita sotto conifera. *Lactarius torminosus*, cappello zonato rosato-aranciato, ricoperto al margine da una fitta peluria, lamelle crema chiaro con riflessi rosati, lattice bianco, simbiote della betulla.

Pleurotus ostreatus



FOTO E. MARRA

Cappello: 5-18 cm, inizialmente convesso poi disteso a ventaglio, margine prima involuto poi appianato, spesso lobato. Superficie sericea con tempo secco vischiosa con l'umido. Colore da bianco crema a grigio brunoastro, fino a grigio scuro con riflessi metallici bruno-violaceo. **Lamelle:** lungamente decorrenti sul gambo, da bianco crema a grigiastre, mediamente fitte, con lamellule. **Gambo:** eccentrico, frequentemente laterale, pieno, sodo, di colore da bianco crema a grigiastro. **Carne** bianca, abbondante di consistenza soda, tenace, che si sfilaccia alla sezione in particolare nella zona del gambo. Odore tenue e debolmente fungino. **Habitat:** crescita autunnale fino ai primi geli su legno vivo o marcescente di latifoglie, solitamente in gruppi a mensola, sovrapposti o cespitosi. **Commestibilità:** specie commestibile e commercializzabile, largamente coltivata anche a scopo amatoriale per la facilità di crescita su substrato vegetale ricomposto e opportunamente inseminato.

Con caratteri simili è *Pleurotus eryngii* che cresce dalla primavera all'autunno su radici o residui di piante di *Eryngium campestre* e *E. maritimum*, con **cappello** eccentrico, depresso o imbutiforme, biancastro poi bruno camoscio-bruno scuro con fibrille radiali chiare, **lamelle** bianche poi ocracee, con filo appena eroso (entrambe le specie sono commercializzabili in ambito nazionale) e *Pleurotus eryngii* var. *ferulae*, che cresce sotto *Ferula communis*, commercializzabile in Calabria.



P.ostreatus

FOTO G. DI CELLO



P. eryngii

FOTO E. MARRA



P. eryngii var. *ferulae*

FOTO V. CURCIO

Russula chloroides



FOTO V. CURCIO

Cappello: da bianco-avorio da giovane poi bianco -crema con macchie bruno ocracee più accentuate con la maturità, da 6 fino a 15 cm di diametro, carnoso, compatto, prima convesso poi espanso e presto depresso fino a imbutiforme. Margine lungamente involuto poi disteso. Cuticola opaca e asciutta su cui aderisce abbondante terriccio. **Lamelle:** fitte e fragili, con numerose lamellule, bianche talora con tonalità tipicamente azzurro glauco in prossimità del gambo, tendenti a macchiarsi di bruno con la maturazione. **Gambo:** corto e robusto attenuato alla base, pruinoso, bianco, frequentemente con sfumature azzurro-glaucos nell'area sotto l'inserzione delle lamelle, inizialmente pieno poi cavernoso. **Carne:** bianca, spessa e, tendente al brunoastro con l'esposizione all'aria, odore non gradevole di salmaastro, sapore tendente all'acre. **Habitat:** quasi interrata in gruppi numerosi, nei boschi di conifere e latifoglie. **Commestibilità:** di scarsa qualità, da alcuni ricercata per la carne compatta che si presta alla conservazione. Specie compresa nell'elenco dei funghi commercializzabili per la Calabria (L.R. n. 30/2001).



FOTO A. BINCOLETTA



FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO

Russula delica



FOTO E. MARRA

Cappello: da 5 a 16 cm, talvolta anche fino a 20 cm, carnoso e compatto, bianco ma diffusamente macchiato di bruno oca, inizialmente emisferico poi convesso infine disteso e depresso fino a imbutiforme a maturità ma con fondo leggermente appianato, orlo ricurvo. Cuticola asciutta e opaca, rugosa diffusamente imbrattata da terriccio e residui di lettiera. **Lamelle:** larghe, rigide e modicamente spaziate, bianco crema e presto diffusamente punteggiate di bruno ruggine, con numerose lamellule di lunghezza diversa. **Gambo:** bianco e macchiato di bruno, tozzo con superficie corrugata e pruinoso, pieno e carnoso poi più molle e frequentemente invaso da larve a maturità. **Carne** abbondante sia nel cappello che nel gambo, dura e cassante, bianca imbrunente se esposta all'aria particolarmente negli esemplari meno giovani, odore non gradevole di pesce. **Habitat:** molto frequente e con nascite spesso abbondanti nei boschi di latifoglie e conifere. **Commestibilità:** di scarsa qualità, ma da alcuni ricercata e utilizzata per la carne compatta che si presta bene conservazione. Ha caratteristiche molto simili a *Russula chloroides*, spesso distinguibili solo con la reazione macrochimica o la microscopia. Specie inserita nella lista dei funghi commercializzabili sul territorio della Regione Calabria (L.R. n. 30/2001).



FOTO A. DE MARCO



FOTO E. MARRA



FOTO E. MARRA


POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Russula delica

FOTO A. DE MARCO



Russula chloroides

FOTO V. CURCIO



Russula chloroides

FOTO A. BINCOLETTO

SPECIE NON COMMESTIBILE



Lactarius piperatus

FOTO V. CURCIO



Lactarius controversus

FOTO G. DI CELLO



Lactarius glaucescens

FOTO A. BINCOLETTO

Principali differenze: *Lactarius piperatus* ha lamelle leggermente rosate e molto fitte, sapore della carne fortemente piccante. *Lactarius controversus* ha lamelle colore rosa carnicino. *Lactarius glaucescens* ha lattice inizialmente bianco poi verde menta, carne che invecchia con l'esposizione all'aria.

nome popolare: "verdone"

Russula virescens



FOTO G. DI CELLO

Cappello: 5-15 cm, prima globoso poi appianato, poco depresso e irregolare. Margine assottigliato. Cuticola separabile al margine, inizialmente bianco-crema poi da verde pallido a verde intenso più scuro al centro. Superficie asciutta, con screpolature irregolari che fratturano la cuticola formando delle areole scure che, con la crescita del cappello si distanziano fra loro lasciando spazio al colore più chiaro del fondo. **Lamelle:** bianco-crema fitte e fragili spesso con piccole macchie brune. **Gambo:** cilindrico, bianco con superficie rugosa, inizialmente pieno poi farcito-cavernoso e fragile, spesso più ingrossato al centro. **Carne:** bianca, dolce, compatta ma friabile, odore leggero e gradevole. **Habitat:** sotto latifoglie dall'estate all'autunno. **Commestibilità:** specie commestibile, inserita nell'elenco regionale dei funghi commercializzabili in Calabria (L.R. n. 30/2001).

La colorazione verde del cappello con lamelle e gambo bianchi, potrebbe fare incorrere il raccoglitore inesperto nella grossolana pericolosa confusione con *Amanita phalloides* (specie potenzialmente mortale) che ha colori simili e anche questa presente, nel medesimo periodo, sotto latifoglie. Solo la conoscenza dei caratteri distintivi delle due diverse specie può evitare il potenziale grave errore.



FOTO G. DI CELLO



FOTO A. DE MARCO




FOTO V. CURCIO

nome popolare: "colombina"

Russula cyanoxantha



FOTO G. DI CELLO

Cappello: fino a 15 cm, carnoso, subgloboso da giovane poi esteso e depresso al centro. Colore variabile nelle tonalità dal bluastro a grigio-violaceo metallico fino a verde oliva (*f.ma peltereaui*) che, nei diversi esemplari, possono singolarmente essere prevalenti ma anche coesistere sfumando uno nell'altro su uno sfondo più chiaro. Cuticola parzialmente separabile a partire dal bordo, di aspetto inizialmente brillante poi più asciutta ma che conserva un aspetto untuoso. Margine a lungo ricurvo poi ottuso. **Lamelle:** da bianche con riflessi azzurrini a bianco-crema, fitte, di aspetto carnoso, tipicamente lardose al tatto e che allo sfregamento sembrano opporsi alla frantumazione.


Gambo: bianco e rugoso, cilindrico, carnoso, spesso più ingrossato al centro, con interno inizialmente pieno poi spugnoso e fragile. **Carne:** bianca, dolce, con odore leggero e gradevole, compatta e gessosa che alla frattura lascia margini netti. **Habitat:** presente, spesso anche abbondantemente, dall'estate fino all'autunno inoltrato nei boschi di latifoglie ma anche di conifere. **Commestibilità:** commestibile, fra le più apprezzate del genere e commercializzabile in Calabria (L.R. n. 30/2001). Particolare attenzione va posta nella raccolta di in quanto la colorazione verde del cappello potrebbe essere causa di confusione con la mortale *Amanita phalloides*.



FOTO E. MARRA



FOTO V. CURCIO



R. cyanoxantha f. peltereaui

G. DI CELLO

Russula vesca



FOTO G. DI CELLO

Cappello: da 4 fino a 14 cm, prima convesso subgloboso, con la crescita appianato, depresso al centro e con orlo assottigliato. Cuticola asciutta e opaca, asportabile al margine, spesso retratta tanto da scoprire le lamelle. Colore dal rosso vinoso al rosa carnicino che spesso sfumano al nocciola chiaro o crema. **Lamelle:** fitte, biforcute verso il gambo, appena decorrenti, bianche o bianco crema, spesso punteggiate di ruggine negli esemplari maturi. **Gambo:** bianco e ruguloso, attenuato alla base, inizialmente pieno poi farcito, che tende ad ingiallire con l'età macchiandosi di bruno. **Carne:** bianca, dolce e soda, che si macchia di scuro alla manipolazione, odore impercettibile. **Habitat:** molto comune nei boschi di latifolia e conifera, fruttifica dalla fine della primavera fino all'autunno. **Commestibilità:** specie commestibile e commercializzabile sul territorio regionale (L.R. n. 30/2001).



FOTO G. DI CELLO




FOTO DI CELLO



FOTO G. DI CELLO

Russula aurea



FOTO V. CURCIO

Cappello: da 5 fino a 10 cm di diametro, molto variabile nella colorazione che va da rosso intenso a rosso arancio spesso con larghe aree giallo oro in particolare al centro, difficilmente con colore omogeneo. Emisferico da giovane, poi convesso appianato e spesso depresso, orlo ottuso e scanalato a maturità. Cuticola parzialmente separabile, di colore brillante con il tempo umido, asciutta con il secco ma che conserva un aspetto untuoso. **Lamelle** fitte, sottili e particolarmente fragili, forcate verso il gambo di colore bianco crema negli esemplari giovani poi giallastre fino a giallo intenso con filo lamellare spesso più intensamente colorato. **Gambo** cilindrico con base arrotondata, bianco nella parte alta con aree giallastre verso la base, superficie rugosa, inizialmente pieno e compatto poi cavernoso. **Carne** bianca e soda da giovane poi particolarmente friabile, di sapore dolce ma priva di odore significativo. **Habitat:** sotto latifoglie, molto comune da tarda primavera fino a inizio autunno, presente anche sotto conifere. **Commestibilità:** specie commestibile e apprezzata per la sua carne delicata. Commercializzabile in Calabria sul territorio regionale (L.R. 30/2001). **Possibile confusione** con *Russula emetica*, che cresce sotto conifera ed ha cappello rosso intenso, rosso ciliegia, lamelle bianche, carne molto piccante ed è responsabile di sindrome gastroenterica.



FOTO V. CURCIO



FOTO A. CONTIN



FOTO C. AGNELLO

Agaricus campestris

FOTO E. MARRA

È la specie tipo del genere *Agaricus*. **Cappello:** carnoso da 5 a 20 cm, da giovane chiuso e globoso, con la crescita emisferico, infine appianato disteso. Colore da bianco rosato a crema, brunastro a maturità. Superficie sericea liscia o fibrillosa-squamosa, margine involuto con residui membranosi che permangono dal distacco dell'anello (velo parziale). **Lamelle:** fitte, rosa carnicino intenso da giovane, poi bruno-nerastre porpora. **Gambo:** bianco o modicamente rosato, giallognolo alla contusione, liscio, affusolato, inizialmente pieno poi midolloso. **Anello:** membranoso bianco, soffice e labile. **Carne:** bianca e soda nel cappello, assume tonalità rosate al taglio. Odore e sapore anisato o di mandorle. **Habitat:** fungo saprofito, fruttifica dall'estate fino all'autunno nei prati e nei pascoli ricchi di sostanza organica, a gruppi anche numerosi che, a volte, formano i così detti "cerchi delle streghe". **Commestibilità:** commestibile, commercializzabile sul territorio nazionale (DPR n. 376/95).



FOTO A. BINCOLETTI



"Cerchio delle streghe"



FOTO A. BINCOLETTI

Agaricus bisporus

FOTO E. MARRA

È la specie saprofito più largamente coltivata e diffusamente commercializzata in tutto il mondo, comunemente conosciuta anche con il nome francese di "*champignon*". **Cappello:** fino a 8-12 cm, abbondantemente carnoso, prima chiuso, ovoido, globoso, poi disteso fino a divenire piano. Superficie liscia che con la crescita si lacera a formare minute squame. Colore da bianco candido a bianco brunastro particolarmente nelle aree sottoposte a manipolazione. Margine a lungo involuto, spesso, irregolarmente lobato, da giovane con residui appendicolari del velo parziale (anello). **Lamelle:** fitte, prima vistosamente rosate ma presto imbrunenti fino a bruno nerastre. **Gambo:** cilindrico, corto e bianco, con superficie liscia sopra l'anello più fioccoso sotto leggermente bulboso alla base. **Anello:** semplice, bianco e membranoso. **Carne:** bianca poi rosata al taglio, odore e sapore gradevole e fungino. **Habitat:** su terreno molto ricco di sostanza organica in particolarmente deiezioni equine. Non molto frequente in natura, viene invece coltivato in modo intensivo. **Commestibilità:** specie commestibile e commercializzabile sul territorio nazionale (DPR n. 376/95).



FOTO E. MARRA



FOTO E. MARRA



FOTO E. MARRA

nome popolare: "prataiolo"

Agaricus arvensis



FOTO A. CONTIN

Cappello: carnoso, da giovane emisferico poi disteso e appianato; superficie bianca, liscia e brillante, leggermente ingiallente alla contusione, più scuro al centro a maturità. **Lamelle** fitte, inizialmente rosate/carnicine, infine decisamente bruno nerastre. **Gambo:** cilindrico, pieno, poi midolloso, con base non bulbosa. Bianco, leggermente giallastro nelle parti manipolate. **Anello:** bianco, persistente, ampio, a forma di ruota dentata, che ingiallisce nelle parti manipolate. **Carne:** tenera, bianca. Odore di anice o mandorle amare. **Habitat:** dalla primavera all'autunno, nelle radure erbose dei boschi, nei prati, su terreno ricco di sostanza organica. **Commestibilità:** buon commestibile. Commercializzabile su tutto il territorio nazionale (DPR n. 376/95).

È importante conoscere le caratteristiche principali delle specie commestibili del genere *Agaricus* (prataioli) anche per la **possibile confusione** con *Amanita verna* o con specie appartenenti al genere *Lepiota*. Tale gravissimo errore in Calabria ha causato episodi mortali di avvelenamento falloideo in ambito familiare.



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. CONTIN



FOTO A. DE MARCO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Agaricus sylvicola

FOTO G. DI CELLO



Agaricus campestris

FOTO A. BINCOLETTO



Agaricus urinascentis

FOTO V. CURCIO

SPECIE TOSSICA



Amanita verna **potenzialmente mortale** FOTO V. CURCIO



Lepiota brunneoincarnata **mortale** FOTO M. CARBONE



Agaricus xanthodermus

FOTO V. CURCIO

Principali differenze: *Amanita verna* ha cappello, lamelle, gambo e anello bianchi, gambo modicamente bulboso alla base e volva bianca membranacea. *Lepiota brunneoincarnata* ha lamelle bianche e taglia piccola. *Agaricus xanthodermus* ha carne fortemente ingiallente e odore chimico.

Lo scambio di *Agaricus* commestibili con *Amanita verna* e specie appartenenti al genere *Lepiota* è causa di avvelenamenti gravissimi potenzialmente mortali.

Tricholoma portentosum



FOTO A. CONTIN

Cappello: grigio scuro, ardesia, con sfumature giallo-olivastre, violacee scure, umbonato, con margine lobato e cuticola percorsa da strie radiali, viscosa a tempo umido che si lascia asportare evidenziando così la tonalità giallastra della carne. **Lamelle:** poco fitte, prima biancastre poi giallognole. **Gambo:** inizialmente pieno poi cavo, cilindrico, ingrossato alla base biancastro con sfumature giallognole o grigio-verdognole. **Carne:** bianco-giallina, giallastra sotto la cuticola, fragile, con delicato odore di farina. **Habitat:** simbiote di conifere, solitamente gregario, crescita in tardo autunno fino ai primi rigori invernali. **Commestibilità:** buon commestibile, per la consistenza della carne viene utilizzato per la conservazione. Specie commercializzabile sull'intero territorio nazionale.



FOTO V. CURCIO



FOTO A. CONTIN



FOTO A. CONTIN

Tricholoma terreum



FOTO A. CONTIN

Cappello: 5-8 cm di diametro, globoso da giovane poi campanulato convesso infine disteso con umbone, margine involuto che spesso si fessura con la crescita. Di aspetto asciutto, con la presenza di fitte fibrille, grigio topo o grigio scuro, che ricoprono pressoché uniformemente l'intera cuticola conferendogli un aspetto lanoso feltrato. **Lamelle:** fragili e poco fitte, prima biancastre poi grigio cenere. **Gambo:** biancastro, cilindrico, liscio o con poche fibrille chiare, prima pieno poi fistoloso spesso cavo a piena maturità. **Carne:** bianca ed esigua, fragile sia nel cappello che nel gambo, sapore mite e non significativo. **Habitat:** nei boschi di conifere o misti dalla primavera al tardo autunno in condizioni ottimali spesso in gruppi di numerosi esemplari. **Commestibilità:** buon commestibile. Specie inserita nell'elenco dei funghi commercializzabili sul territorio nazionale (DPR n. 376/95).



FOTO V. CURCIO



FOTO A. CONTIN



FOTO G. DI CELLO

Tricholoma imbricatum



FOTO V. CURCIO

Cappello: da 5 a 15 cm di diametro, emisferico poi da campanulato a spianato con umbone più o meno evidente. Colore bruno porpora più scuro al centro e chiaro al margine, superficie asciutta e screpolata in minute squamule di colore bruno sovrapposte ad embrice (tegola) da cui il nome. **Lamelle:** fitte, larghe con numerose lamellule e filo appena dentellato, inizialmente di colore bianco crema poi tendenti ad imbrunire picchiettandosi di minute macchie rugginose. **Gambo:** slanciato biancastro in alto e con minute fibrille brune alla base, cilindrico, macchiato di ruggine con l'età. **Carne:** soda nel cappello fibrosa nel gambo imbrunente al taglio. Odore debolmente farinoso o non significativo sapore modicamente amaro. **Habitat:** a gruppi nei boschi di conifere, prevalentemente Pinus, da fine estate ad autunno inoltrato. **Commestibilità:** mediocri commestibile, da alcuni apprezzato per il gusto amarognolo che tende a scomparire con la conservazione, inserito nell'elenco dei funghi commercializzabili sul territorio nazionale.



FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Tricholoma portentosum

FOTO A. CONTIN



Tricholoma terreum

FOTO A. CONTIN



Tricholoma portentosum

FOTO A. CONTIN

SPECIE TOSSICA



Tricholoma sciodes

FOTO A. CONTIN



Tricholoma virgatum

FOTO A. CONTIN



Tricholoma pardinum

FOTO V. CURCIO

Principali differenze: nessuna delle specie similari tossiche raffigurate ha tonalità nettamente gialle come *Tricholoma portentosum*.

T. sciodes ha crescita prevalentemente sotto faggio, cappello umbonato, grigio-metallico con sfumature lilla o violette, più scuro con la crescita, odore di terra o di erba, sapore amarognolo. *T. virgatum* ha cappello grigio nerastro, conico campanulato con umbone acuto, gambo biancastro e appena bulboso, sapore acre o pepato

Calocybe gambosa



FOTO E. MARRA

Cappello: carnosso, emisferico, poi piano-convesso, con lievi gibbosità; margine liscio inizialmente involuto. Cuticola liscia e asciutta, da bianco-crema a giallo-nocciola più scura al centro. **Lamelle:** fitte, da bianche a crema pallido. **Gambo:** bianco da giovane poi color crema, più intenso verso la base, cilindrico o leggermente clavato. **Carne:** soda, bianca, odore caratteristico di farina o di pane fresco. **Habitat:** nei prati ai margini dei boschi è uno dei primi funghi primaverili generalmente di fine Aprile (da cui il nome comune di "fungo di San Giorgio" la cui ricorrenza è il 23 Aprile. Gregario nelle stazioni di crescita si presenta a gruppi di più esemplari. È un fungo saprofita ma è facile trovarlo sotto cespugli di biancospino, rosa canina, rovi, prugno selvatico e rosacee in generale e per questo denominato "prugnolo". **Commestibilità:** buon commestibile molto ricercato. Specie inserita nell'elenco dei funghi commercializzabili sul territorio nazionale (DPR n. 376/95).



FOTO A. DE MARCO



FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Calocybe gambosa

FOTO E. MARRA



Calocybe gambosa

FOTO E. MARRA

SPECIE TOSSICA



Inocybe erubescens

FOTO G. PARTACINI



Inocybe erubescens

FOTO G. PARTACINI

Principali differenze: *Inocybe erubescens* (*I. patouillardi*) cresce a fine periodo primaverile, ha cappello con umbone e margine lacerato, cuticola fibrillosa, lamelle inizialmente chiare ma presto di colore bruno ferruginoso e soprattutto tendenza all'arrossamento particolarmente sui bordi del cappello e sulla metà inferiore del gambo.

La medesima stagione primaverile di crescita della similare specie commestibile *Calocybe gambosa*, il medesimo habitat praticolo in prossimità di latifoglie ed il colore spesso molto chiaro degli esemplari più giovani, rendono *Inocybe erubescens* un fungo particolarmente pericoloso per il rischio di **possibile confusione**.

La specie contiene infatti quantità relativamente elevate di muscarina, un alcaloide responsabile della **sindrome muscarinica**, caratterizzata da sintomi di tipo neurologico che insorgono entro sei ore dall'assunzione.

L'accidentale intossicazione, in soggetti debilitati o cardiopatici, può avere conseguenze anche gravi.

Cantharellus cibarius



FOTO E. MARRA

Cappello: irregolare, inizialmente convesso, poi aperto con margine a lungo convesso, sinuoso e lobato, generalmente depresso al centro fino a imbutiforme. Liscio, brillante, di colore giallo arancio, giallo pallido, giallo biancastro. **Imenio:** non possiede lamelle ma delle **pseudolamelle a pliche** anastomosate più simili a nervature giallo-arancio o più chiare, poco profonde, decorrenti al gambo. **Gambo:** corto, sodo, cilindrico attenuato verso la base, pieno, giallo come il cappello. **Carne:** bianca, compatta, di consistenza fibrosa nel gambo ma tenera. Odore e sapore gradevole, fruttato, di albicocca. **Habitat:** simionte terricolo, cresce gregario a gruppi di vari esemplari sia sotto latifoglie che sotto conifere, dalla primavera all'autunno. **Commestibilità:** ottimo commestibile molto ricercato ed apprezzato commercializzabile su tutto il territorio nazionale (DPR n. 376/95)..




FOTO G. DI CELLO




FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Cantharellus cibarius var. *amethysteus* FOTO E. MARRA



Cantharellus cibarius FOTO A. DE MARCO


SPECIE TOSSICA




Omphalotus olearius FOTO G. DI CELLO



Hygrophoropsis aurantiaca FOTO M. CARBONE



Cantharellus cibarius (pliche) FOTO V. CURCIO



Omphalotus olearius (lamelle vere) FOTO E. MARRA

Principali differenze: *Omphalotus olearius*, tossico responsabile di sindrome gastro-intestinale significativa, è lignicolo con crescita solitamente cespitosa (a gruppi di più esemplari) su ceppaia di latifolia o su vecchie radici interrato, ha lamelle vere (non pliche) molto fitte e consistenza tenace della carne. *Hygrophoropsis aurantiaca*, tossico, cresce su residui legnosi marcescenti, ha lamelle vere giallo arancio intenso molto decorrenti e gambo solitamente eccentrico.

Hydnum rufescens



FOTO G. DI CELLO

Cappello: 4-7 cm, da giovanissimo convesso poi più o meno appianato e vistosamente irregolare, molto fragile, depresso al centro a maturità; di aspetto prima vellutato poi liscio, giallo-ocra o con tonalità decisamente aranciate, margine ondulato lobato. **Imenio:** costituito da piccoli aculei (detti idni) fragili, dello stesso colore del cappello o appena aranciati, adnati al gambo e non decorrenti. **Gambo:** biancastro, pieno, spesso eccentrico che vira al giallo aranciato se contuso. **Carne:** bianca, giallastra, compatta ma fragile. Odore gradevole delicatamente fungino. **Habitat:** nei boschi, su lettiera molto umida sia di latifoglie che di aghifoglie, gregario ma a piccoli gruppi, dall'estate fino ai primi geli tardo autunnali. **Commestibilità:** specie ricercata, di ottima commestibilità anche se può risultare appena amara. Ricercato in Calabria e inserito nella lista dei funghi commercializzabili sul territorio regionale (L.R. n. 30/01).



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

Hydnum repandum



FOTO G. DI CELLO

Cappello: 5-12 cm, inizialmente convesso poi piano fino a concavo, molto irregolare, gibboso, margine spesso lobato, colore da giallo pallido a giallo aranciato con cuticola di aspetto vellutato pruinoso. **Imenio** ad aculei (idni) stretti e alti, decorrenti sul gambo, giallo pallidi e molto fragili. **Gambo** grosso, a forma irregolare più chiaro del cappello, fragile, frequentemente eccentrico. **Carne** bianca e friabile ingiallente al taglio fino ad assumere tonalità aranciate, odore leggero e gradevole, fruttato, sapore mite leggermente amaro negli esemplari più vecchi. **Habitat** nei boschi di latifoglie e conifere dall'estate fino al tardo autunno, in forma gregaria anche di numerosi esemplari. **Commestibilità** buona. Commercializzabile sull'intero territorio nazionale

Simile per aspetto a *Hydnum rufescens*, dal quale si differenzia per cappello dai toni più chiari, giallastri, dimensioni maggiori e aculei che scendono sul gambo (decorrenti). Simile a prima vista anche a *C. cibarius* dal quale si differenzia per la presenza degli aculei.




FOTO A. DE MARCO



FOTO A. DE MARCO



FOTO G. DI CELLO

Craterellus cornucopioides



FOTO E. MARRA

Forma molto riconoscibile ad imbuto nero con tonalità bluastre o grigio scuro con una cavità che continua in parte del gambo che è molto corto e dello stesso colore. Superficie esterna liscia da giovane che diventa più rugosa a maturità mentre la superficie interna appare ricoperta da minute squame scure. Margine irregolare ed ondulato. **Carne** esile e fragile, con odore delicatamente fungino. **Habitat** specie simbiote, greggia in boschi di latifoglie o misti, con crescita fino alla fine della stagione micologica. La forma ad imbuto o a trombetta e la nascita nel periodo novembrino nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, spiegano il nome comune di "trombetta da morto" dato alla specie. **Commestibilità:** specie commestibile, molto ricercata da alcuni nonostante il colore poco invitante. **Possibile confusione** con *Cantharellus cinereus*, anche questa specie commestibile, simile per aspetto e forma ma con colore più grigiastro-brunastro, gambo pieno e non cavo ed imenio percorso dapliche sulla superficie esterna più marcate con crescita solitamente sotto castagno.



FOTO E. MARRA



FOTO E. MARRA



FOTO M. CARBONE

Hygrophorus marzuolus



FOTO E. MARRA

Cappello: da bianco negli esemplari coperti da fogliame, a grigio metallico/ardesia a maturità; carnoso, inizialmente subgloboso, poi convesso, infine piano e depresso al centro con margine sottile e lobato. superficie asciutta, poco vischiosa a tempo particolarmente umido. **Lamelle** spaziate, di aspetto ceroso-lardaceo, bianche poi grigiastre a maturità. **Gambo:** robusto, tozzo, a volte però anche slanciato, cilindrico, attenuato alla base, asciutto e finemente fibrilloso, bianco, poi grigiastro a maturità. **Carne:** tenera, friabile, più consistente nel gambo, bianco-grigia sotto la cuticola, con odore debole ma aromatico e fungino. **Habitat:** in boschi di conifere e di latifoglie, semi interrato sotto la lettiera di foglie e per questo considerato come semiipogeo. Nasce allo sciogliersi della neve, solitamente a partire da marzo ma con clima mite anche da febbraio, la crescita in particolari condizioni favorevoli (clima umido e fresco) può prolungarsi anche fino ai primi di maggio. **Commestibilità:** buon commestibile, ricercato per la nascita precoce.



FOTO E. MARRA



FOTO V. CURCIO



FOTO E. MARRA

Hygrophorus pudorinus



FOTO M. CARBONE

Cappello: 6-18 cm, aranciato o anche più pallido con tonalità bianco rosate/aranciate, carnoso, convesso da giovane poi disteso con margine generalmente revoluto, glutinoso a tempo umido. **Gambo:** con superficie glutinosa, carnoso, pieno, generalmente bianco e minutamente squamato di rosa /arancio. **Lamelle:** bianche con tonalità rosee, spaziate, annesse al gambo o appena decorrenti. **Carne:** bianca con tonalità rosate, soda che, con odore spiccatamente resinoso. **Habitat:** nascita autunnale nei boschi di conifera particolarmente abete bianco o misto a latifoglie. Crescita solitamente gregaria. **Commestibilità:** commestibile, molto ricercato e apprezzato in particolari aree del territorio calabrese per la consistenza della carne che si presta bene alla conservazione. **Inserito nella lista dei funghi commercializzabili nel territorio calabrese dalla L.R. n.30/2001**, da alcuni può non essere apprezzato a causa del particolare odore balsamico/resinoso.



FOTO M. CARBONE



FOTO M. CARBONE



FOTO M. CARBONE

Hygrophorus russula



FOTO G. DI CELLO

Cappello: da 7 a 15 cm da emisferico a convesso, poi spianato fino a depresso al centro, colore vistosamente screziato di rosso porporino o vinoso, più intenso verso il centro ma sempre su sfondo chiaro, Orlo involuto, ondulato con la crescita. **Lamelle:** poco fitte e sottili, appena decorrenti sul gambo, biancaste, poi con tonalità rosata, a maturità spesso macchiate di rosso. **Gambo:** pieno, slanciato e cilindrico, con superficie bianca nella parte alta, macchiato da fibrille rosso porporino verso la base. **Carne:** bianca e compatta che diventa rossastra al taglio in particolare nella zona del gambo, odore e sapore leggeri e poco definiti. **Habitat:** nei boschi di latifolia, in particolare sotto leccio, sughero o corbezzolo, dall'autunno inoltrato fino ai primi geli. **Commestibilità:** discreta, apprezzato e ricercato da alcuni per la conservazione. Presente nella lista regionale dei funghi commercializzabili in Calabria.




FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO



FOTO V. CURCIO

Armillaria mellea

FOTO E. MARRA

Cappello: da 5 a 10 (15) cm, carnoso, inizialmente emisferico poi aperto e convesso spesso con modesto umbone. Cromatismi variabili, dal giallo mielato al bruno giallastro fino al bruno scuro olivastro anche in dipendenza dell'essenza arborea o residui, su cui si sviluppa. Cuticola viscosa con l'umido, decorata da minute squamule fugaci, orlo sottile appena striato. **Lamelle:** fitte, poco decoranti sul gambo, biancastre, poi giallo paglierino, più scure a maturità e macchiate di bruno rossastro. **Gambo:** cilindrico bianco crema giallastro più scuro alla base, fiocoso sotto l'anello, slanciato e sinuoso per la crescita cespitosa, presto fibroso-legnoso. **Anello:** bianco giallastro, persistente, fiocoso all'orlo. **Carne** da biancasta a bianco crema, spessa al cappello coriacea nel gambo. **Habitat:** in tardo autunno parassita pianta viva o saprofita su residui legnosi prevalentemente di latifolia ma anche di alberi da frutto. **Commestibilità:** considerata specie commestibile e commercializzabile il consumo però è limitato ai soli esemplari giovani privati del gambo e condizionato ad un pretrattamento con bollitura, per 15-20 minuti, a cui segue accurato lavaggio e allontanamento dell'acqua di cottura. **Senza accurato pretrattamento o se ha subito congelamento da crudo, causa sindrome gastrointestinale anche severa.**

Possibile confusione con specie mortali *Galerina* o tossiche *Gymnopilus* e *Hypholoma*.



FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE

*Armillaria mellea*

FOTO G. DI CELLO

*Armillaria mellea*

FOTO A. DE MARCO

*Armillaria mellea*

FOTO A. DE MARCO

SPECIE TOSSICA

*Galerina marginata*

FOTO P. PARSAL

*Gymnopilus junonius*

FOTO E. MARRA

*Hypholoma fasciculare*

FOTO E. MARRA

Principali differenze: *Galerina sp.* piccole dimensioni, cappello 2-3 cm, lamelle bruno ocrea poco fitte, gambo esile, anello poco visibile, carne esigua. *Gymnopilus junonius*, dimensioni più massicce, cappello, gambo, anello e carne, giallo oro, giallo aranciato, sapore amaro. *Hypholoma fasciculare* cappello giallo zolfo, giallo aranciato, lamelle prima giallo zolfo, poi grigio verdastre o olivastre. Carne esigua, sapore amaro.

Morchella esculenta



FOTO V. CURCIO

È la specie tipo del genere Morchella. **Mitra** (il cappello assume tale denominazione): cava, molto variabile nella forma, da arrotondata fino a conica, così come nel colore, dalle diverse tonalità del giallo-ocra fino al bruno, con alveoli disseminati ampi separati da coste flessuose, **Gambo**: cavo, tozzo, da biancastro a crema, con base allargata. **Carne**: biancastra e fragile. **Habitat**: è un fungo saprofita frequente in primavera nei boschi e nelle radure spesso nelle aree bruciate. La specie si presta a essere coltivata arricchendo il terreno di coltivazione con residui legnosi appositamente insemiati. **Commestibilità**: molto ricercata e apprezzata ma tutto il genere è **tossico da crudo o poco cotto** per la presenza di acido elvellico, termolabile, che viene degradato con la normale cottura. Il consumo, pertanto, deve avvenire solo dopo adeguata e prolungata cottura in pentola senza coperchio. Tutte le specie appartenenti al genere Morchella sono commercializzabili su tutto il territorio nazionale.



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. DE MARCO



FOTO A. DE MARCO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Morchella elata

FOTO V. CURCIO



Morchella conica

FOTO A. DE MARCO



Morchella sp. mitra alveolata

FOTO A. DE MARCO

SPECIE TOSSICA



Gyromitra gigas

FOTO V. CURCIO



Gyromitra esculenta

FOTO E. MARRA



Gyromitra gigas mitra cerebriorme

FOTO E. MARRA

Principali differenze: *Gyromitra esculenta* e *Gyromitra gigas* hanno mitra (cappello) cerebriorme (che ricorda la forma esterna del cervello). *Morchella sp.* ha mitra con evidenti cellette (alveolata).

Ramaria botrytis



FOTO M. CARBONE

Forma: coralloide costituita da un tronco biancastro da cui si staccano corte ramificazioni bianche, via via più piccole, che all'apice assumono una tipica colorazione rosso-vinosa. **Carne:** bianca, compatta ma tenera e dall'odore fruttato. **Habitat:** simbionte di latifoglie con crescita generalmente isolata in periodo estivo/autunnale. **Commestibilità:** commestibile dopo adeguata cottura, ricercata per la compattezza della carne che si presta bene alla preparazione di conserve sott'olio. In Calabria è specie commercializzabile L.R. n. 30/01. Per la tipica colorazione rosso-vinosa delle minute ramificazioni terminali, *Ramaria botrytis* è consigliata come l'unica ramaria da raccogliere per il facile riconoscimento dei giovani esemplari. Allo stesso genere, infatti, appartengono altre specie tossiche responsabili di sintomatologia gastrointestinale anche severa. Occorre tuttavia ricordare che è necessario consumare solo esemplari giovani in cui è ben distinguibile la colorazione richiamata poiché spesso, a maturità, le diverse ramarie assumono tonalità sbiadite e poco distinguibili.



FOTO G. DI CELLO




FOTO M. CARBONE



FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE




Ramaria botrytis

FOTO G. DI CELLO



Ramaria botrytis

FOTO A. DE MARCO



Ramaria botrytis

FOTO G. DI CELLO

SPECIE TOSSICA




Ramaria formosa

FOTO E. MARRA



Ramaria pallida

FOTO A. CONTIN



Ramaria formosa

FOTO A. DE MARCO

Principali differenze: *Ramaria formosa*, tronco bianco, rami principali allungati rosa arancio e poi, giallastri in sommità. La presenza dei tre colori descritti (bianco alla base, rosa-arancio nella porzione mediana e giallo in sommità) sono d'aiuto nel riconoscimento. *Ramaria pallida* ha forma molto ramificata con rami di colore bianco sporco pallido da cui il nome. Crescita generalmente sotto conifera o in boschi misti con latifoglie.

Grifola frondosa



FOTO M. CARBONE

Forma cespugliosa, costituita da un numero consistente (anche centinaia) di piccoli cappelli di dimensione variabile e a forma di spatola o di ventaglio, sovrapposti e uniti da un corto **gambo** schiacciato ad un ceppo centrale fortemente ramificato, tozzo e corto. Ogni singolo cappello ha margine irregolare e ondulato, cuticola variegata, grigio brunastra o ocrea al bordo, più chiara fino al bianco verso il gambo. **Imenio**: costituito da corti tubuli decorrenti e minuti pori bianchi, più grandi a maturità. **Carne**: bianca, consistente nella parte centrale più fragile verso i cappelli in particolare da giovane. Odore fungino da giovane. A maturità la consistenza della carne diventa coriacea con odore sgradevole. **Habitat**: fungo parassita con crescita alla base o sul tronco di latifoglie viventi o saprofita su loro ceppaie. Forma cespi, anche di notevole grandezza, in estate- autunno. **Commestibilità**: apprezzato, da giovane, per la consistenza soda della carne. Specie compresa nella lista dei funghi commercializzabili nel territorio calabrese, L.R. n. 30/2001.



FOTO M. CARBONE



FOTO M. CARBONE



FOTO M. CARBONE

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE COMMESTIBILE



Grifola frondosa

FOTO G. DI CELLO



Grifola frondosa

FOTO G. DI CELLO



Grifola frondosa

FOTO M. CARBONE

SPECIE NON COMMESTIBILE



Meripilus giganteus

FOTO G. DI CELLO



Meripilus giganteus

FOTO G. DI CELLO



Meripilus giganteus

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze: *Meripilus giganteus* ha cappelli mediamente più grandi e larghi, annerisce al tocco ed ha carne coriacea e legnosa fin da giovane.

Le principali Specie tossiche

I funghi sono “frutti del bosco” molto ricercati, ma la bellezza delle diverse forme e loro disponibilità in natura, tuttavia, spesso non equivale ad una sicura innocuità alimentare; la difficoltà ad individuare la specie e la confusione con specie tossiche possono essere, infatti, causa di spiacevoli ed anche gravi casi d'intossicazione.

I sintomi

I sintomi dell'intossicazione variano a seconda della specie fungina consumata così come varia il tempo che intercorre tra il consumo del pasto responsabile e l'inizio della sintomatologia (definito come *tempo di latenza*). Proprio il tempo di latenza rappresenta un primo utile indicatore sia della presumibile gravità dell'intossicazione che delle probabili specie fungine responsabili. In base a tale indicatore temporale si possono così manifestare **sindromi a lunga latenza**, con insorgenza dei primi sintomi da 6 fino a 20 ore dopo l'ingestione e **sindromi a breve latenza**, con insorgenza della sintomatologia da 30 minuti fino a 6 ore dall'ingestione.

Sindromi a lunga latenza

Hanno generalmente insorgenza con sintomi di tipo gastrointestinali. Sono le più gravi e il loro esito può essere gravemente invalidante e spesso mortale; sono molto subdole per l'inizio tardivo della sintomatologia che può indurre a sottovalutare i rischi o essere motivo di confusione diagnostica con altra patologia di tipo gastrointestinale. A causa della marcata e precoce aggressività delle tossine possono determinare danno, spesso irreversibile, agli organi colpiti e per tale motivo **il successo terapeutico è strettamente dipendente dalla tempestività del ricorso alle cure ospedaliere.**

(comparsa dei sintomi da 6 ore dopo il pasto)

SINDROME	TEMPO MEDIO DI LATENZA	PRINCIPALI SPECIE RESPONSABILI	Decorso
FALLOIDEA	10- 12 ore fino a 24	<i>Amanita phalloides</i> , <i>Amanita verna</i> , <i>Amanita virosa</i> , <i>Galerina marginata</i> , <i>Lepiota castanea</i> , <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Lepiota josserandii</i> e molte <i>Lepiote</i> di piccola taglia.	Gravissimo spesso mortale
ORELLANICA	36 ore fino a diversi giorni	<i>Cortinarius orellanus</i> , <i>Cortinarius speciosissimus</i>	Gravissimo spesso mortale
GIROMITRICA	8 - 12 ore	<i>Gyromitra esculenta</i> , <i>Gyromitra gigas</i> ,	Grave , raramente mortale
RABDOMIOLITICA	24 - 72 ore	<i>Tricholoma equestre</i>	Grave con casi di mortalità.

– SINDROME FALLOIDEA (LUNGA LATENZA)

Provoca il maggior numero di decessi. La tossina responsabile dell'avvelenamento è l'amanitina che causa epatite fulminante per necrosi (morte cellulare) degli epatociti (cellule epatiche). Le specie fungine più frequentemente responsabili sono ***Amanita phalloides***, ***Amanita verna*** e ***Amanita virosa***, altre specie ugualmente tossiche appartengono ai generi ***Lepiota*** e ***Galerina***. L'amanitina mantiene la sua tossicità anche dopo cottura prolungata e nel fungo fresco, ha concentrazione tale che è sufficiente un solo cappello di *A. phalloides* per causare la morte di un individuo adulto.

Sintomi: vomito e diarrea intensa, dolori addominali, con esordio, mediamente, dopo 10 -12 ore dal consumo. A tale fase gastrointestinale segue, entro 24-48 ore, la fase clinica caratterizzata dal grave danno epatico. Non esiste un antidoto contro tale avvelenamento, solo il trattamento precoce, secondo il protocollo terapeutico specifico, può diminuire il tasso di mortalità o evitare il ricorso al trapianto d'organo quando realizzabile.

Principali specie responsabili:

Amanita phalloides



FOTO E. MARRA

Amanita verna



FOTO A. CONTIN

Amanita virosa



FOTO A. BAGLIVO

Lepiota brunneoincarnata




FOTO V. CURCIO

Lepiota subincarnata



FOTO V. CURCIO

Galerina marginata




FOTO V. CURCIO



Amanita phalloides



FOTO A. DE MARCO

Cappello: solitamente verdastro ma anche completamente bianco (forma alba) o con tonalità nocciola più o meno scuro, liscio, con superficie tipicamente disegnata da fibrille più scure. **Lamelle** bianco latte, fitte. **Gambo:** con zebraure giallo olivastre su sfondo bianco, bulboso alla base. **Anello** alto, ampio, a gonnellino. **Volva:** (sacchetto alla base del gambo) bianca, ampia, membranosa, che avvolge il gambo. **Odore:** nullo o anche debolmente fungino, sgradevole a maturità. Dimensioni medio-grandi. **Habitat:** molto diffuso in autunno sotto latifolia ma anche sotto conifera. **Specie velenosa potenzialmente mortale che contiene Amanitina, tossina altamente epatotossica.**

Possibile confusione con funghi commestibili quale *Russula virescens* o con altre Russule verdi. In un caso di avvelenamento in Calabria, nel 2013, *Amanita phalloides*, pur con le significative differenze tra le due specie, è stata confusa con *Amanita caesarea* (fungo commestibile).



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
potenzialmente mortale



Amanita phalloides

FOTO V. CURCIO



Amanita phalloides

FOTO A. DE MARCO



Amanita phalloides (ovolo chiuso)

FOTO A. DE MARCO

SPECIE COMMESTIBILE



Russula virescens

FOTO G. DI CELLO



Amanita caesarea

FOTO G. DI CELLO



Amanita caesarea (ovolo chiuso)

FOTO A. DE MARCO

Principali differenze: *R. virescens* ha cuticola del cappello con screpolature areolate (a mosaico), carne cassante (si frattura di netto) gambo privo di anello e di volva. *Amanita caesarea* ha cappello aranciato, lamelle, anello e gambo giallo canarino. **L'ovolo chiuso** di *A. caesarea* in sezione presenta profilo di gambo, lamelle e cappello gialli quello di *A. phalloides* è quasi interamente bianco ad eccezione del profilo del cappello che appare delineato da una linea verdognola.

Amanita verna

FOTO V. CURCIO

Cappello: bianco, superficie liscia, brillante. **Lamelle:** fitte bianche. **Gambo:** bianco, slanciato, bulboso alla base. **Anello:** bianco, fragile. **Volva:** bianca a sacco, membranosa. **Odore:** nullo, sgradevole a maturità. **Habitat:** sotto latifolia con nascita solitamente primaverile. Molto abbondante in alcune annate specialmente sotto castagno e quercia. **Specie tossica potenzialmente mortale che contiene Amanitina, tossina altamente epatotossica.**

In un caso mortale di avvelenamento, Aprile 2012, in provincia di Cosenza, la raccolta era stata effettuata sotto ulivo con presenza a distanza di querce, mentre in caso mortale, Marzo 2013, in provincia di Vibo Valentia, esemplari di *A. verna* erano stati raccolti in una zona rurale, ai margini di un bosco di Cerro. In entrambi i casi la confusione era avvenuta con funghi commestibili del genere *Agaricus* dai quali si distingue per il colore delle lamelle, bianche in *A. verna*, rosate e poi bruno cioccolato negli *Agaricus*, quest'ultimi, inoltre, non possiedono la volva alla base del gambo.



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO



FOTO A. BAGLIVO

Amanita virosa

FOTO B. RECCHIA

Specie rara in Calabria. **Cappello:** bianco, eccentrico e irregolare con superficie setosa. **Lamelle** fitte, bianche anche a maturità. **Gambo:** bianco, decorato da fioccosità bianche e ingrossato alla base (bulboso). **Anello:** bianco membranoso e fragile. **Volva:** bianca inguainante. **Habitat:** cresce dall'estate all'autunno solitamente nei boschi umidi montani di conifere o misti con latifoglie, Betulla e Faggio. **Specie velenosa mortale che contiene Amanitina, tossina altamente epatotossica.**

Anche tale specie può essere confusa con specie commestibili appartenenti al genere *Agaricus*.



FOTO A. BAGLIVO




FOTO A. BAGLIVO



FOTO A. BAGLIVO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome falloidea



Amanita verna

FOTO V. CURCIO



Amanita verna

FOTO E. MARRA



Amanita virosa

FOTO A. BAGLIVO

Principali differenze: *Agaricus sp.* ha lamelle inizialmente chiare, presto rosate, poi brune ed è privo di volva.

SPECIE COMMESTIBILE



Agaricus sylvicola

FOTO V. CURCIO



Agaricus sylvicola

FOTO E. MARRA



Agaricus sylvicola

FOTO G. DI CELLO

Sindrome falloidea (lunga latenza)

Genere *Lepiota s.l.*




FOTO E. MARRA

Caratteri comuni del genere

Piccole dimensioni, terricole. **Cappello:** generalmente di pochi cm di diametro, superficie decorata da squame scure, marroni/brunastre su sfondo chiaro, disposte in modo concentrico che si addensano verso il centro. **Lamelle:** bianco latte, mediamente fitte. **Gambo:** corto, fistoloso con anello più o meno evidente e spesso con decorazioni scagliose più scure. **Odore:** da nullo a sgradevole. **Habitat:** dall'estate all'autunno in ambiente sabbioso, nei prati o ai margini del bosco con crescita solitaria o anche di più esemplari. Diverse specie del Genere *Lepiota* (di cui per brevità se ne raffigurano solo alcune), contengono **Amanitina**, tossina altamente epatotossica. **Possibile confusione** con funghi commestibili del genere *Agaricus* (prataioli) dal quale si distingue per il colore delle lamelle che nel genere *Lepiota* sono sempre bianche mentre nel genere *Agaricus* sono inizialmente, rosate e poi bruno cioccolato. **Ogni anno si registrano casi di avvelenamento, anche con esito anche mortale, dovuti a errore di riconoscimento di questo Genere.**



L. brunneoincarnata FOTO M. CARBONE



Lepiota subincarnata FOTO V. CURCIO



L. castanea

FOTO V. CURCIO

Galerina s.l.



FOTO V. CURCIO

Caratteri comuni del genere

Funghi di piccole dimensioni. **Cappello:** ocraceo, che appare striato per trasparenza, superficie liscia, untuosa e igrofana a tempo umido (inscurisce per l'assorbimento di umidità). **Lamelle:** bruno ocraceo non molto fitte. **Gambo:** esile, cilindrico con anello, spesso poco visibile, ma anche privo di anello in alcune specie. **Carne:** esigua con odore farinoso. **Habitat:** generalmente su detriti legnosi.

Diverse specie appartenenti al Genere *Galerina* sono **tossiche e potenzialmente mortali** perché contengono Amanitina, tossina altamente epatotossica.



FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO




FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome falloidea



Lepiota brunneoincarnata

FOTO A. BAGLIVO

SPECIE COMMESTIBILE



Agaricus campestris

FOTO A. BINCOLETTA



Galerina marginata Peter Pearsall / US Fish and Wildlife Service



Kuehneromyces mutabilis

FOTO M. CARBONE



Galerina marginata

FOTO D. MOLTEN



Armillaria mellea

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze: *Armillaria mellea* ha cappello più carnoso, lamelle biancastre da giovane poi giallo mielate fino a brunastre con macchie più scure a maturità. Gambo alto, cilindrico e ingrossato alla base. Anello ben presente, chiaro, fioccoso e persistente. Crescita cespitosa. *Agaricus sp.* ha lamelle rosate da giovane poi brune. *Galerina marginata* ha piccole dimensioni, cappello untuoso, lamelle non fitte, gambo esile, anello poco visibile, carne esigua, odore farinoso

– SINDROME ORELLANICA (LUNGA LATENZA)

La sindrome fu descritta per la prima volta nel 1955 dal Microbiologo e Micologo Stanisław Grzymala che isolò da *Cortinarius orellanus* la micotossina, che denominò orellanina, responsabile di avvelenamenti collettivi mortali, con grave danno renale, che si verificarono in Polonia dal 1952 al 1955, legati al consumo della specie fino ad allora erroneamente ritenuta commestibile.

In seguito la tossina venne isolata anche in *Cortinarius rubellus* (*speciosissimus*, *orellanoides*) e in misura minore, anche in **altre specie appartenenti a genere Cortinarius**.

L'orellanina manifesta la sua spiccata attività tossica nel rene, organo nel quale induce necrosi cellulare con conseguente insufficienza renale acuta. È termostabile mantenendo inalterata la sua tossicità anche a seguito di prolungata cottura.

L'intossicazione accidentale avviene, il più delle volte, per confusione con specie commestibili del genere *Chroogomphus*, molto simili per cromatismo a *C. orellanus* e *C. rubellus*. A conferma di ciò gli episodi di intossicazione sono stati descritti, prevalentemente, in aree geografiche dove tali specie vengono consumate per consuetudini locali.

Sintomi: è una **sindrome a lunga latenza** che si manifesta generalmente in due fasi. La prima, da 8 fino a 36 ore dal pasto, con insorgenza di sintomi aspecifici di spossatezza, secchezza del cavo orale, sete intensa, nausea e possibili episodi di vomito e diarrea seguiti, dopo alcune ore, da intensa diuresi. A tale fase, che può mancare o essere poco significativa, segue un periodo di apparente remissione. Dopo 7-18 giorni, compaiono i sintomi dell'insufficienza renale con sete intensa, inappetenza, dolore lombare bilaterale, scarsa produzione di urina, dolori muscolari ed encefalopatia. In questa fase le lesioni causate al rene sono già irreversibili tanto da rendersi necessario il ricorso alla dialisi o a trapianto d'organo, quando possibile.

È questo uno degli avvelenamenti da funghi in cui, tranne nei casi di avvelenamento contemporaneo di più commensali, può essere difficile l'individuazione della causa in quanto, nei casi singoli, difficilmente il paziente ricorda e riferisce al medico di aver consumato, alcune settimane prima, funghi non controllati.

Sindrome orellanica (lunga latenza)

Cortinarius orellanus



FOTO A. BAGLIVO

Cappello: da 4 a 9 cm di diametro, prima emisferico poi disteso con umbone centrale, a maturità appianato e gibboso. Colore da bruno rugginoso a rosso aranciato, superficie secca, asciutta, sericea, finemente ricoperta da fibrille, margine inizialmente involuto, sottile spesso lobato e fessurato a maturità. **Lamelle:** spaziate, alte, spesse, con filo modicamente eroso, adnate al gambo (si inseriscono sul gambo per un breve tratto) di colore bruno rugginoso. **Gambo:** cilindrico e slanciato, liscio e asciutto, con base più o meno affusolata e spesso flessuosa, inizialmente giallo chiaro, poi rugginoso in particolare alla base e con fibrille bruno rossicce. Cortina (struttura filamentosa, che protegge le lamelle) chiara e poco evidente. **Carne:** inizialmente soda, da giallo paglierino a fulvo rugginosa con odore di rapa. **Habitat:** presente da fine estate all'autunno nei boschi di latifolia, in particolare sotto quercia. **Specie potenzialmente mortale** che contiene "orellanina", tossina responsabile di grave danno renale.




FOTO A. BAGLIVO



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus, C. orellanoides)



FOTO A. DE MARCO

Cappello: fino a 8 cm, inizialmente conico, poi conico campanulato e infine disteso e spesso con persistente umbone acuto. Colore da bruno rossastro a bruno ocraceo, con superficie asciutta, opaca, fittamente ricoperta da minute fibrille. **Lamelle:** rade, larghe, annesse al gambo, inizialmente dello stesso colore del cappello poi modicamente più scure, bruno rossastre. **Gambo:** cilindrico e slanciato, prima pieno poi farcito, fulvo rossastro più chiaro del cappello e tipicamente decorato da bande giallastre più o meno evidenti. Cortina giallastra e spesso poco evidente. **Carne** inizialmente gialla poi bruno rossiccia particolarmente alla base del gambo, odore rafanoide o vagamente fungino. **Habitat:** frequente in gruppi anche numerosi nei boschi di conifera, in particolare di abete rosso, da fine estate all'autunno. Di frequente rinvenimento nelle regioni dell'arco alpino, raro in Calabria.

Specie potenzialmente mortale la cui tossina, "orellanina", presente in concentrazione inferiore rispetto a *C. orellanus* è comunque capace di causare grave danno renale.




FOTO A. BAGLIVO



FOTO A. CONTIN




FOTO A. BAGLIVO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
potenzialmente mortale



Cortinarius orellanus

FOTO V. CURCIO



Cortinarius orellanus

FOTO A. BAGLIVO



Cortinarius rubellus

FOTO A. CONTIN

SPECIE COMMESTIBILE



Chroogomphus rutilus

FOTO A. CONTIN



Chroogomphus rutilus

FOTO A. CONTIN



Chroogomphus helveticus

FOTO M. CARBONE

Principali differenze: *Chroogomphus rutilus*, ha superficie secca, liscia e lucida, vischiosa a tempo umido, di colore mattone o bruno olivacea. Lamelle larghe che scendono sul gambo (decorrenti) di colore rosso mattone poi olivastre o bruno nerastre. *Chroogomphus helveticus* ha cappello con superficie secca, non vischiosa e lamelle più chiare ma sempre decorrenti sul gambo.

– SINDROME GIROMITRICA (LUNGA LATENZA)

La tossina responsabile è la gyromitrina contenuta in *Gyromitra esculenta* e *Gyromitra gigas*. **Sintomi:** dopo 8 / 24 ore dal consumo, possibile comparsa di sintomi di tipo gastrointestinale non sempre marcati; segue cefalea, sonnolenza, crampi muscolari, anemia, emolisi, danno renale ed epatico, convulsioni.

Sindrome giromitrica (lunga latenza)

Gyromitra esculenta



Gyromitra esculenta

FOTO E. MARRA

Mitra: (cappello) nel suo insieme globosa, cava all'interno, di colore bruno rossiccio, con introflessioni accentuate formanti lobi che ricordano le circonvoluzioni cerebrali. **Gambo:** bianco, cavo. **Carne:** cerosa e cassante. **Habitat:** saprofita primaverile in boschi di conifera.

Gyromitra gigas



Gyromitra gigas

FOTO V. CURCIO

Mitra: (cappello) con dimensioni anche molto grandi, superficie esterna formante lobi irregolari rotondeggianti poco introflessi. **Gambo:** bianco cavo. **Carne:** fragile e ceracea. **Habitat:** saprofita con crescita prevalentemente primaverile in boschi di conifera.

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA



Gyromitra gigas

FOTO V. CURCIO

SPECIE COMMESTIBILE



Morchella sp.

FOTO A. DE MARCO

– SINDROME RABDOMIOLITICA (LUNGA LATENZA)

Responsabile di tale sindrome è il consumo di *Tricholoma equestre*. I primi episodi sono stati registrati in Francia nel periodo 1992-2000, 12 casi che hanno causato 3 decessi. Successivamente altri 2 casi analoghi sono stati segnalati in Polonia sempre per consumo abbondante e con pasti ravvicinati di *Tricholoma equestre*. La tossina, tuttavia, non è stata ancora isolata. **Sintomi:** dopo 24 – 72 ore dall'ingestione comparsa di spossatezza, dolore ed affaticamento muscolare con aggravamento progressivo. Nei casi mortali è stato riscontrato un significativo danno muscolare per necrosi (morte cellulare) delle cellule dei muscoli striati con rilevanti danni cardiaci (miocardite acuta) ed insufficienza renale acuta. Per la gravità dei casi verificati, pur non essendo stati registrati casi analoghi in Italia, l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 20 Agosto 2002 ha **vietato, su tutto il territorio nazionale, la raccolta, la commercializzazione e la conservazione di *Tricholoma equestre*.**

Sindrome rabdomiolitica (lunga latenza)

Tricholoma equestre



Tricholoma equestre

FOTO G. DI CELLO

Cappello: prima convesso poi pianeggiante, appena viscoso con tempo umido, colore giallo intenso, a volte con toni verdastri al centro e presenza di fine squamettatura rossastra. **Lamelle:** smarginate, giallo zolfo mediamente fitte. **Gambo:** concolore alle lamelle spesso ricurvo e leggermente ingrossato alla base. **Carne:** bianco giallastra con odore debolmente farinoso. **Habitat:** normalmente diffuso sotto conifere, raramente sotto latifoglie.

– SINDROME DA ACIDO POLIPORICO O NEUROTOSSICA TARDIVA (LUNGA LATENZA)

Specie responsabile della sindrome è *Hapalopilus rutilans*. L'intossicazione si verifica per scambio con il commestibile *Fistulina hepatica*, con il quale ha in comune la sola crescita su legno. I **sintomi** sono caratterizzati inizialmente da nausea e vomito che insorgono dopo 10-12 ore dal pasto, seguiti da sintomi di tipo neurologico, vertigini, atassia (difficoltà a coordinare i movimenti), disturbi della visione, sonnolenza, segni di encefalopatia (alterazione del tracciato elettroencefalografico compatibile con edema cerebrale), sofferenza epatica (aumento dei livelli delle transaminasi) e insufficienza renale (aumento della creatinemia). Uno dei segni che caratterizzano l'intossicazione è l'emissione di urina di colore violetto. L'acido poliporico, contenuto in quantità significative nel fungo, è considerato responsabile dell'intossicazione.

Sindrome da acido poliporico (lunga latenza)

Hapalopilus rutilans



FOTO B. RECCHIA

Forma: a mensola fissati lateralmente al substrato di crescita. Superficie di colore bruno-cannella, vellutata o villosa da giovane poi più liscia. Margine arrotondato e ondulato. La **superficie inferiore** (fertile): è costituita da tubuli e pori dello stesso colore cannella a forma inizialmente rotondi poi poligonali. **Carne:** prima giallastra, poi bruna di consistenza inizialmente molle poi tenace. **Odore:** gradevole. **Habitat:** specie abbastanza comune, saprofita, cresce su tronchi o rami morti di latifoglie, più frequentemente quercia, ma anche di conifere. La superficie del carpoforo, in ogni sua parte, reagisce al contatto con basi forti (idrato di potassio) assumendo una intensa colorazione viola.

– SINDROME ACROMELALGICA O ERYTROMELALGICA (LUNGA LATENZA)

La sindrome è scatenata dal consumo di *Paralepistopsis amoenolens* (*Clitocybe amoenolens*). Alcuni casi registrati in Italia nel 2002 ad Avezzano (AQ), si sono verificati per grossolana confusione della specie tossica con le specie commestibili *Pleurotus eryngii* e *Clitocybe gibba*. I **sintomi** generalmente compaiono dopo 48-72 ore dal consumo ma, in alcuni casi anche a distanza di più giorni, sono caratterizzati da una dolorosa vasodilatazione delle piccole arterie delle estremità degli arti, con violento dolore bilaterale a mani e piedi che appaiono arrossati e caldi. Il dolore, descritto come urente (simile a scosse elettriche o punture di spillo), peggiora con l'esposizione delle parti colpite al caldo e appare lenito solo da impacchi ghiacciati. Resistente alla comune terapia analgesica, nella fase acuta è fortemente invalidante e può perdurare anche per mesi prima di arrivare alla guarigione.

Sindrome acromelalgica o erytromelalgica (lunga latenza)

Paralepistopsis amoenolens (*Clitocybe amoenolens*)



FOTO G. CIULLI

La specie è caratterizzata da un intenso e complesso odore fruttato-floreale, da cui l'epiteto "*amoenolens*" (dal gradevole profumo). **Cappello:** beige-aranciato più o meno intenso, carnoso. Inizialmente convesso, poi piano, infine depresso. Cuticola liscia, pruinosa da giovane. Margine lungamente involuto, frequentemente lobato a maturità. **Lamelle:** fitte, decorrenti, concolori al cappello o con tonalità più chiare. **Gambo:** cilindrico più sbiadito rispetto al colore del cappello che ingloba parte della lettiera. **Carne:** chiara, compatta, più abbondante all'inserzione del gambo. **Habitat:** sotto aghifoglie, saprofita di lettiera di *Pinus* e *Cedrus*.

– SINDROME NORLEUCINICA O NEFROTOSSICA (LATENZA INTERMEDIA)

In Italia la sindrome è legata al consumo di *Amanita proxima* confusa con *Amanita ovoidea*, in America una sindrome analoga è stata descritta per il consumo di *Amanita smithiana*. Le tossine responsabili della sindrome causata da *Amanita proxima* sono ancora sconosciute anche se, nell'*Amanita smithiana*, sono state isolate norleucina allenica e chlorocrotilglicina ritenute responsabili della nefrotossicità. Per la similitudine del danno renale causato dalle due specie (necrosi tubulare) si ipotizza che analoghe tossine siano presenti anche in *Amanita proxima*. La sintomatologia insorge fra 4 e 12 ore per tale motivo la sindrome è considerata a latenza intermedia. I **Sintomi** iniziali nausea, vomito, diarrea, dolori addominali sono seguiti da anoressia, vertigini, segni di danno epatico, ansia, oliguria (diminuita quantità di urina prodotta) fino ad anuria (mancata produzione di urina) e insufficienza renale acuta. Il danno renale con la remissione della sintomatologia, che avviene entro 1-2 settimane dall'inizio del trattamento terapeutico, appare reversibile e non permane danno d'organo.

Sindrome norleucinica o nefrotossica (latenza intermedia)

Amanita proxima




Amanita proxima

FOTO A. BAGLIVO

Cappello bianco avorio, carnoso, inizialmente emisferico poi convesso o appianato, margine liscio e modicamente appendicolato. Cuticola liscia e sericea con scarsi residui ocracei del velo generale. **Lamelle** fitte, bianco latte o appena rosate. **Gambo** bianco, fiocoso - pruinoso, cilindrico, bulboso alla base. **Anello** bianco, membranaceo e persistente. **Volva** libera al gambo, a sacco, ben evidente e tenace, di colore nettamente aranciato-rossiccio, carattere che contribuisce alla separazione dalla similare *Amanita ovoidea* con la quale condivide il medesimo habitat. **Carne** bianca e compatta. **Habitat**, su terreno sabbioso e calcareo nei boschi termofili con latifoglie e conifere.

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA



Hapalopilus rutilans

FOTO B. RECCHIA

SPECIE COMMESTIBILE



Fistulina hepatica

A. DE MARCO



Paralepistopsis amoenolens

FOTO G. CIULLI



Pleurotus eryngii var. *ferulae*

FOTO A. DE MARCO



Amanita proxima

FOTO A. BAGLIVO



Amanita ovoidea

FOTO A. DE MARCO

Principali differenze: *Fistulina hepatica* ha carne elastica e succulenta, prima biancastra poi rossa con venature chiare. *Pleurotus eryngii* fruttifica in associazione con ombrellifere. *Amanita ovoidea* ha margine appendicolato da residui di velo cremoso-burroso e fiocchi di analoga consistenza sul gambo. Anello fragile e cremoso. Volva bianca a sacchetto con minute granulazioni giallastre. **Considerata specie commestibile se ne sconsiglia comunque il consumo per la facile confondibilità con la similare specie tossica *Amanita proxima* e con le Amanite bianche potenzialmente mortali.**

Sindromi a breve latenza

Rappresentano la gran parte delle intossicazioni da funghi la cui gravità varia, da specie a specie, ma anche al quantitativo consumato. Solitamente si tratta d'intossicazioni che, pur provocando sintomatologia spesso anche significativa, raramente comportano un reale pericolo per la vita del paziente, tuttavia possono rappresentare un evento sanitario critico, con esito anche letale, per bambini, donne in gravidanza, anziani o pazienti con patologie concomitanti. Le specie fungine responsabili sono diverse decine e le tossine responsabili non in tutti i casi sono state individuate. I sintomi possono insorgere già al termine del pasto e comunque in un intervallo di tempo di 3-6 ore.

In relazione alla diversa specie e alle diverse tossine in questa contenute, i sintomi possono essere prevalentemente di tipo gastro-intestinale (nausea, vomito, dolori addominali, diarrea persistente), di tipo neurologico (cefalea, vertigini, confusione mentale, disturbi visivi, allucinazioni, tremori, convulsioni). In altri casi possono manifestarsi disturbi circolatori o crisi emolitiche. La sintomatologia solitamente regredisce dopo alcuni giorni ma è comunque necessario un periodo di osservazione ospedaliera per il possibile verificarsi di complicazioni di tipo cardiocircolatorio.

SINDROME	Tempo di latenza	Principali Specie responsabili	Decorso
GASTROINTESTINALE	1-3 ore	<i>Omphalotus olearius</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> , <i>H. sublateritium</i> , <i>Tricholoma sciodes</i> , <i>T. pardinum</i> , <i>T. filamentosum</i> , <i>Lactarius torminosus</i> , <i>Agaricus gruppo xanthodermatei</i> , <i>Entoloma sinuatum</i> , <i>Clitocybe nebularis</i> , <i>Chlorophyllum molybdites</i> , <i>Chlorophyllum rachodes</i> , <i>Ramaria formosa</i> , <i>Russula emetica</i> ecc.	Da alcune ore a qualche giorno.
MUSCARINICA	15 -60 minuti	Genere <i>Inocybe</i> (diverse specie), Genere <i>Clitocybe</i> (gruppo <i>Clitocybe</i> bianche)	Da 2-16 ore, possibile complicazioni per collasso cardiocircolatorio o paralisi respiratoria
PANTERINICA	15-30 min. - 4ore	<i>Amanita pantherina</i> , <i>Amanita muscaria</i>	12 - 24 ore.
COPRINICA	15 min. - 1 ora	<i>Coprinus atramentarius</i>	6 - 24 ore
PAXILLICA	1-3 ore dopo ingestione ripetuta	<i>Paxillus involutus</i> , <i>Paxillus filamentosus</i>	Alcuni giorni con possibile evoluzione anche grave.
PSICODISLEPTICA	30 minuti - 1 ora	Genere <i>Psilocybe</i> (diverse specie), Genere <i>Panaeolus</i> (diverse specie), Genere <i>Stropharia</i> (diverse specie)	2 - 12 ore

— SINDROME GASTROINTESTINALE

È la più frequente fra quelle a breve latenza. Le specie responsabili sono un numero considerevole e causano l'insorgenza di sintomi a distanza di 3-6 ore dal pasto con comparsa di nausea, vomito, dolore addominale e diarrea. Tali sintomi possono protrarsi da alcune ore fino a 24 - 48 ore e in alcuni casi, possono persistere per alcuni giorni. La perdita di liquidi che avviene con il vomito e la diarrea, può determinare disidratazione fino al collasso.

Principali specie responsabili: *Omphalotus olearius*, *Hypholoma fasciculare*, *Hypholoma sublateritium*, *Tricholoma pardinum*, *Tricholoma filamentosum*, *Tricholoma sciodes*, *Lactarius torminosus*, *Agaricus gruppo xanthodermatei*, *Entoloma sinuatum*, *Clitocybe nebularis*, *Chlorophyllum molybdites*, *Chlorophyllum rachodes*, *Ramaria formosa*, *Russula emetica* e altre diverse specie.

Omphalotus olearius



FOTO G. DI CELLO

Cappello: inizialmente convesso, presto disteso e infine imbutiforme, di colore da arancio intenso a bruno arancio, superficie liscia, brillante. **Lamelle:** spesse, giallo arancio molto decorrenti sul gambo.

Gambo: giallo arancio più scuro verso la base, cilindrico, frequentemente eccentrico, ricurvo e con base attenuata. **Carne:** tenace, fibrosa, di colore giallo arancio con odore lieve ma gradevole. **Habitat:** nei boschi di latifoglie dall'estate all'autunno. Specie lignicola, su ceppaie di querce e olivi o su vecchie radici interrate.

È **specie tossica**, frequentemente scambiata, da raccoglitori poco esperti, con il commestibile *Cantharellus cibarius* (galletto). È **responsabile di sindrome gastrointestinale**, con sintomatologia marcata.



FOTO V. CURCIO



FOTO E. MARRA




FOTO G. DI CELLO

Hypholoma fasciculare



FOTO E. MARRA

Cappello: da 3 a 8 cm, emisferico campanulato, disteso a maturità. Liscio, giallo solforino ma anche aranciato intenso, con tonalità più scura, fulvastra, al centro. Margine talora appendicolato per residui cortiniformi velo parziale che da giovane copre le lamelle. **Lamelle:** fitte, inizialmente giallo zolfo poi tipicamente grigio verdognole, grigio nerastre con la maturazione delle spore. **Gambo:** slanciato, flessuoso alla base, con presenza di fini fibrille aranciate, più scure alla base. **Carne:** di modesta quantità nel cappello, gialla, bruno rugginosa alla base del gambo. Odore non rilevante, sapore nettamente amaro. **Habitat:** dalla primavera fino ai primi geli, su legno marcescente di vecchie ceppaie o su tronco vivo in particolare di latifoglie, in gruppi numerosi a crescita fascicolata.

È **specie tossica responsabile di sindrome gastrointestinale**, conosciuta come “falso chiodino” e scambiata, da raccoglitori poco esperti, con *Armillaria mellea* “chiodino vero”. *Hypholoma lateritium* ha stesse caratteristiche ma con cappello e base del gambo rosso mattone.



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO



Hypholoma lateritium FOTO E. MARRA

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome gastrointestinale



Omphalotus olearius

FOTO E. MARRA

SPECIE COMMESTIBILE



Cantharellus amethysteus

FOTO E. MARRA



Hypholoma fasciculare

FOTO E. MARRA



Armillaria mellea

FOTO E. MARRA



Hypholoma lateritium

FOTO E. MARRA



Armillaria mellea

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze: *Cantharellus cibarius* cresce su terreno (non su legno) non ha lamelle vere ma pliche. *Armillaria mellea* ha lamelle bianco mielate e anello persistente.

Tricholoma pardinum



FOTO V. CURCIO

Cappello: da 6 a 18 cm, carnoso, emisferico, poi convesso anche a maturità, con basso umbone centrale. Colore da grigio chiaro a grigio cenere brunastro, asciutto e ricoperto da squame concentriche grigio scuro nerastre su sfondo chiaro, più fitte al centro. Margine a lungo involuto, tende a diventare irregolarmente lobato e spesso fessurato con la crescita. **Lamelle:** moderatamente fitte, spesse, di colore bianco crema o appena grigiastre, con presenza di minute goccioline incolori nei giovani esemplari, giallastre con riflessi olivastri con l'età. **Gambo:** robusto, pieno, bianco, superficie finemente fibrillosa che diventa imbrunente ocracea al tocco in particolare verso la base. **Carne:** soda, consistente in particolare nel cappello, bianca con tonalità grigie sotto la cuticola, odore farinoso. **Habitat:** in estate autunno nei boschi di conifera, in particolare sotto abete bianco ma anche sotto faggio. Assieme al molto simile *Tricholoma filamentosum* (*Tricholoma pardinum* var. *filamentosum*) è **specie tossica, responsabile d'intensa sindrome gastrointestinale con sintomatologia marcata.**



FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome gastrointestinale



Tricholoma pardinum

FOTO G. DI CELLO



Tricholoma filamentosum

FOTO G. DI CELLO



Tricholoma sciodes

FOTO A. CONTIN

SPECIE COMMESTIBILE



Tricholoma terreum

FOTO A. CONTIN



Tricholoma portentosum

FOTO A. CONTIN



Tricholoma portentosum

FOTO A. CONTIN

Principali differenze: *Tricholoma terreum* di aspetto generale gracile, ha cuticola con fibrille sottili, fitte di colore grigio ardesia/nerastre lamelle grigiastre. *Tricholoma portentosum* ha cappello lamelle e gambo con soffuse tonalità gialle. *Tricholoma sciodes* (tossico) superficie liscia, cuticola brillante e metallica, gambo grosso e pieno, lamelle da bianco a grigiastre, carne acre.

Lactarius torminosus

FOTO M. CARBONE

Cappello: da 4 a 11 cm di diametro, convesso e depresso già nei giovani esemplari poi disteso con centro ombelicato. Colore da rosa vivo a rosa aranciato con zonature più scure concentriche, superficie ricoperta da una fitta presenza di fibrille chiare, più lunghe al margine, tali da costituire una fitta lanugine, più dirada al centro e che tende ad attenuarsi con la crescita. Margine involuto.

Lamelle: molto fitte, appena decorrenti sul gambo, bianco crema rosate. **Gambo:** da bianco crema a rosato, prima sodo e pieno poi farcito, superficie talvolta con rare fossette (scrobicoli) dal fondo rosato. **Carne:** soda ma fragile, spessa in particolare nel cappello, bianco crema o con sfumature rosate, sapore acre, piccante, odore fruttato. **Lattice** bianco che non cambia di colore. **Habitat:** comune sotto betulla, di cui è simbiote, fruttifica dall'estate fino ai primi geli tardo autunnali.

Specie tossica responsabile di marcata sindrome gastrointestinale tanto che, in alcune regioni, viene indicato con il nome comune di "peveraccio delle coliche". Lo scambio può avvenire per confusione con *Lactarius deliciosus* o con altri *Lactarius* commestibili a lattice arancio o rosso aranciato/vinoso.



FOTO M. CARBONE



FOTO V. CURCIO



FOTO A. DE MARCO

***Agaricus xanthodermus* (gruppo xanthodermatei)**

FOTO V. CURCIO

Caratteristiche comuni del gruppo sono il gambo bianco, l'ingiallimento marcato alla contusione o al semplice tocco, di ogni parte della superficie, in particolare la base del gambo che, anche in sezione, si colora nettamente di giallo citrino. Odore sgradevole, chimico, di fenolo o d'inchiostro maggiormente apprezzabile alla base del gambo.

Agaricus xanthodermus è la specie che rappresenta bene l'intero gruppo. **Cappello:** da 5 a 13 cm, emisferico con margine involuto poi disteso e piano, bianco o bianco crema, (più scuro, fibrilloso squamuloso in *Agaricus moelleri*, asciutto, giallo alla contusione). **Lamelle** fitte, rosate, bruno nerastre a maturità. **Anello:** ampio, membranoso. **Gambo:** bianco, ingiallente, midolloso al centro. **Carne:** bianca che vira velocemente al giallo al tocco o al taglio, maggiormente alla base del gambo, odore chimico, di inchiostro. **Habitat:** in estate e autunno nei prati o nei boschi aperti di conifere o latifoglie. **Gruppo considerato tossico** e causa di sindrome gastrointestinale con sintomi più o meno severi.

*Agaricus moelleri**Agaricus xanthodermus**Agaricus xanthodermus*

Entoloma sinuatum

FOTO A. DE MARCO

Cappello: carnosio, generalmente umbonato, inizialmente emisferico a maturità diventa pianeggiante con basso umbone, colore da bianco crema a grigiastro con riflessi metallici, cuticola con minute fibrille innate, viscosa con l'umido, secca e di aspetto sericeo con il tempo asciutto, margine prima involuto poi più disteso, spesso ondulato e fessurato. **Lamelle:** fitte, inizialmente con colorazione giallastre poi rosate infine rosa salmone. **Gambo:** robusto, alto e pieno, biancastro o con tonalità grigiastre, spesso con base ingrossata e ricurva. **Carne:** bianca, soda, odore di farina che diventa sgradevole a maturità. **Habitat:** frequente e gregario nei boschi di latifoglie dall'estate fino all'autunno inoltrato.

Specie tossica, definito dai francesi "*le perfide*" (il perfido) per l'accattivante odore di farina degli esemplari giovani che può attrarre il raccogliatore inesperto. È costantemente responsabile di sindrome gastrointestinale molto severa (vomito, diarrea) con violenti dolori addominali.



FOTO G. DI CELLO



FOTO A. DE MARCO



FOTO V. CURCIO

Clitocybe nebularis

FOTO G. DI CELLO

Cappello: prima convesso poi disteso, grigio cenere con tonalità più scure al centro. **Lamelle:** fitte bianco crema e decorrenti sul gambo. **Gambo:** robusto con base ingrossata, da bianco crema a grigiastro. **Carne:** compatta, chiara, odore intenso, penetrante, sui generis e tipico della specie. **Habitat:** specie saprofita e gregaria, in boschi di latifoglie e conifere fino ai primi geli.

Per diverso tempo considerato come fungo commestibile dopo prolungata prebollitura, in realtà spesso è responsabile di sindrome gastrointestinale che si manifesta in modo incostante fra i consumatori. La specie contiene inoltre "principi biologicamente attivi", i cui effetti sono ancora oggetto di studio e fra questi una modica quantità di "*nebularina*", sostanza con attività cancerogena dimostrata in laboratorio. Per i non rari casi d'intossicazione, la specie è stata esclusa dal commercio. Per il principio di massima cautela **se ne sconsiglia fortemente la raccolta e il consumo.**



FOTO G. DI CELLO



FOTO V. CURCIO



FOTO G. DI CELLO

Ramaria formosa



FOTO E. MARRA

Forma che ricorda il corallo con il tronco bianco e numerose ramificazioni cilindriche con angolazione alla base a forma di U, ascendenti in modo parallelo e denticolate alla sommità. La tipica triplice colorazione: bianca del tronco, rosa-arancio dei rami e gialla della sommità, permettono da giovane un facile riconoscimento della specie. **Carne:** fragile, bianca leggermente rosata che assume tonalità più intense alla manipolazione. **Habitat:** nei boschi di latifoglie in estate autunno.

Ramaria formosa è specie tossica il cui consumo provoca sindrome gastrointestinale violenta spesso a rapidissima insorgenza.

La caratteristica di molte ramarie, che assumono a maturità toni sbiaditi che non ne consentono una immediata distinzione, porta alla frequente confusione delle specie commestibili con quelle tossiche.



FOTO G. DI CELLO



FOTO A. DE MARCO



FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome gastrointestinale



Ramaria formosa

FOTO G. DI CELLO



Ramaria formosa

FOTO V. CURCIO



Ramaria pallida

FOTO A. CONTIN

SPECIE COMMESTIBILE



Ramaria botrytis

FOTO G. DI CELLO



Ramaria aurea

FOTO G. DI CELLO



Ramaria botrytis

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze: *Ramaria pallida* ha ramificazioni biancastre o crema, erette e fitte, che alla manipolazione assumono tonalità brunastra. Base tronca, compatta e carnosa. La specie è tossica con effetto fortemente lassativo ed emetico. *Ramaria Botris* ha tronco bianco con apici delle ramificazioni color vinaccia. *Ramaria aurea* ha tronco bianco-crema giallastro e apici delle ramificazioni giallo oro.

Chlorophyllum molybdites



FOTO E. MARRA

Specie tossica tropicale di recente apparsa in Italia dove, a causa del cambiamento climatico in atto, ha trovato condizioni ambientali favorevoli alla crescita inizialmente in Sicilia e poi in Calabria.

Cappello: da giovane sub-globoso brunastro, poi aperto e disteso fino a 10-25 cm di diametro con orlo appendicolato da velo lanuginoso. Umbone centrale ocrea/bruno, cuticola asciutta, feltrata, con squame ocracee in placche più fitte al centro. **Lamelle:** fitte, libere al gambo, prima bianco crema poi grigio/olivastre. **Gambo:** liscio, slanciato, bulboso e chiaro alla base, più scuro al centro, imbrunente alla manipolazione. **Anello:** ampio, non molto spesso, con margine doppio, sfrangiato, a maturità scorrevole sul gambo. **Carne:** tenera, biancastra nel cappello, poi arrossante che scurisce con l'esposizione all'aria, fibrosa e imbrunente al gambo. Odore gradevole leggermente fungino. **Habitat:** gregario in terreni sabbiosi dei litorali, nei prati ornamentali e negli spazi verdi urbani, compare dopo le prime piogge a fine estate autunno.

La specie è responsabile di sindrome gastroenterica con sintomi di significativa intensità.



FOTO E. MARRA



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA
responsabile di sindrome gastrointestinale



Agaricus xanthodermus

FOTO V. CURCIO

SPECIE COMMESTIBILE



Agaricus urinascent (macrosporus)

FOTO A. CONTIN



Chlorophyllum molybdites

FOTO G. DI CELLO



Macrolepiota procera

FOTO E. MARRA



Chlorophyllum rhacodes

FOTO A. BINCOLETTI



Macrolepiota procera

FOTO G. DI CELLO

Principali differenze: *Chlorophyllum molybdites* si differenzia da *Macrolepiota procera* (la comune mazza di tamburo) perché ha gambo liscio (non zebrato) che si macchia di bruno alla manipolazione, lamelle inizialmente chiare poi nettamente grigio-verdastre. *Agaricus xanthodermus* ha carne nettamente ingiallente, giallo cromo alla base del gambo, odore chimico di fenolo. *Chlorophyllum rhacodes* ha gambo liscio (non zebrato), prima chiaro poi brunastro che si macchia di rosso se manipolato o scalfito. Carne nettamente arrossante poi scura, di sindrome gastrointestinale in particolare se poco cotto.

– SINDROME PANTERINICA O NEUROTOSSICA ANTICOLINERGICA (BREVE LATENZA)

Causata prevalentemente dal consumo di *Amanita muscaria* o di *Amanita pantherina*. Principali responsabili della sindrome sono considerati l'acido ibotenico e il muscimolo contenuti nella specie in alta concentrazione. I **Sintomi**: prevalentemente a carico del sistema nervoso centrale insorgono da 30 minuti a 3 ore dopo il consumo, con vertigini, euforia, tremori, stato confusionale, crisi convulsive, allucinazioni, stato soporoso fino al coma. La gravità è in relazione al quantitativo ingerito. La specie, contrariamente a quanto lascerebbe pensare il nome, contiene solo piccole quantità della tossina muscarina (abbondantemente presente invece, in molte specie del genere *Inocybe* e nelle *Clitocybe* bianche).

Sindrome pantherinica (breve latenza)

Amanita muscaria



FOTO E. MARRA

Cappello: globoso da giovane poi convesso infine disteso. Colore rosso vivo, rosso aranciato, cuticola liscia ricoperta da verruche bianche residuo del velo generale. **Lamelle** bianche e fitte. **Gambo**: bianco, che termina con un bulbo ricoperto da una volva dissociata in verruche. **Anello** membranoso, ampio. **Carne**: bianca, odore insignificante. **Habitat**: in terreno acido con aghifoglie e latifoglie.



FOTO E. MARRA



FOTO G. DI CELLO



FOTO A. DE MARCO

Sindrome pantherinica (breve latenza)

Amanita pantherina



FOTO G. DI CELLO

Cappello: inizialmente emisferico, infine appianato e disteso, da nocciola a bruno scuro con margine finemente striato. Cuticola liscia, vischiosa a tempo umido, ricoperta da minute verruche fioccosse bianche (residuo del velo generale) spesso disposte in modo concentrico dilavabili dalla pioggia. **Lamelle**: bianche e fitte. **Gambo**: bianco, cilindrico, bulboso alla base, con residui di volva dissociata in anelli. **Anello**: bianco, fragile e basso sul gambo. **Carne**: bianca odore non significativo. **Habitat**: sotto conifere e latifoglie dall'estate all'autunno. Dai raccoglitori viene considerato la "spia del porcino" perché, come accade anche con altre specie (*Clitopilus prunulus* e *Amanita muscaria*) gli vengono attribuite, dalla consuetudine, le stesse esigenze ambientali (grado di umidità e temperatura) necessarie allo sviluppo del porcino.



FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO



FOTO G. DI CELLO

– SINDROME MUSCARINICA NEUROTOSSICA COLINERGICA (BREVE LATENZA)

La tossina responsabile è la muscarina che è contenuta in diverse specie appartenenti principalmente al genere *Inocybe* e al genere *Clitocybe* in particolare in quelle bianche (*C. phyllophila*, *C. cerussata*, *C. dealbata*, *C. candicans*). **Sintomi**, a brevissima insorgenza da 15 - 30 minuti fino a 3 ore dopo il pasto, con disturbi visivi, miosi (diminuzione del diametro della pupilla) cefalea, dolori addominali, aumento della salivazione, scolo nasale, intensa sudorazione e lacrimazione, broncospasmo e aumento delle secrezioni bronchiali, ipotensione e possibile collasso cardiocircolatorio. I sintomi generalmente regrediscono entro 12 -16 ore. Come antidoto viene utilizzata l'atropina per la sua azione anticolinergica.

Sindrome muscarinica (breve latenza)

Inocybe s.l.



Inocybe sp.

FOTO E. MARRA

Caratteri comuni del Genere Il genere *Inocybe* ha caratteristiche macroscopiche omogenee tanto che la determinazione frequentemente necessita dello studio al microscopio. Sono funghi con grandezza da piccola a media, con **cappello** conico da giovane, poi campanulato o disteso, generalmente umbonato e superficie da quasi liscia a fibrillosa, spesso lacerata. Colorazioni generalmente smorte da biancastre a ocracee fino a toni brunastrì. **Lamelle**: chiare da giovane poi da ocrea fino a brunastrì per il colore conferito dalle spore mature (ocrosporei). **Gambo**: cilindrico, da liscio a fibrilloso talvolta con base appena bulbosa. **Carne** esigua, da biancastra a brunastra, in alcune specie arrossante, odore generalmente sgradevole o fruttato. **Habitat**: ai margini del bosco, praticole con preferenza di terreno sabbioso. Tutte le specie appartenenti al genere *Inocybe* sono considerate tossiche, alcune in modo particolare per l'alto contenuto di muscarina. Possibile confusione con *Marasmius oreades* (commestibile).

Sindrome muscarinica (breve latenza)

Clitocybe s.l. (Clitocybe bianche)



Clitocybe cerussata

FOTO A. BINCOLETTO

Caratteri comuni del genere Carattere distintivo del genere *Clitocybe* sono le lamelle che si prolungano sul gambo (decorrenti). Genericamente sono funghi terricoli di medio-piccole dimensioni, fatta eccezione per alcune specie con grandezza più significativa. Producono spore bianche (leucosporei).

Clitocybe bianche (*C. phyllophila*, *C. cerussata*, *C. rivulosa*, *C. dealbata*, *C. candicans*).

Le specie a cappello chiaro, dal bianco al crema, sono particolarmente pericolose per il loro alto contenuto in muscarina. Hanno dimensioni medio-piccole con **cappello** a forma emisferica da giovane, poi piano e infine tipicamente avallato o imbutiforme, con colorazioni tendenti al bianco e superficie dall'aspetto glassato o ceroso. **Lamelle**: bianche decorrenti sul gambo. **Gambo**: cilindrico, bianco, talvolta con base più ingrossata. **Carne**: tenace, con odore mite. **Habitat**: ai margini del bosco su lettiera di fogliame marcescente, in autunno, spesso in numerosi esemplari.

Molti dei casi d'intossicazione muscarinica sono dovuti alla facile confondibilità delle *Clitocybe* bianche con il commestibile *Clitopilus prunulus* o con esemplari dalle tonalità chiare di *Clitocybe gibba* (imbutino commestibile). Per tali motivi si sconsiglia fortemente la raccolta di tali due ultime specie ai neofiti inesperti.

POSSIBILE CONFUSIONE

SPECIE TOSSICA

responsabile di sindrome muscarinica



Inocybe cervicolor

FOTO M. CARBONE



Inocybe curvipes

FOTO M. CARBONE



Clitocybe cerussata

FOTO V. CURCIO

SPECIE COMMESTIBILE



Marasmius oreades

FOTO M. CARBONE



Marasmius oreades

FOTO M. CARBONE



Clitopilus prunulus

FOTO E. MARRA

Principali differenze: *Marasmius oreades* cappello con superficie liscia, crema nocciola più scuro con tempo umido. Lamelle spaziate crema/giallastre. Gambo slanciato, bianco/crema, tenace ed elastico odore particolare della specie (di mandorle o di nocciole). *Clitopilus prunulus*, lamelle fitte e decorrenti che assumono tonalità rosate con la maturazione delle spore. Carne fragile con tipico e accentuato odore di farina.

– SINDROME COPRINICA (BREVE LATENZA)

Causa dell'intossicazione è il consumo di *Coprinopsis atramentaria* (*Coprinus atramentarius*) ma anche di *Clitocybe clavipes* e *Pholiota squarrosa*, unitamente all'assunzione di bevande alcoliche. La tossina responsabile è la coprina che ha caratteristiche simili a un farmaco (Disulfiram) utilizzato per produrre repulsione verso le bevande alcoliche nei forti bevitori. La coprina, così come il farmaco ha l'effetto di interferire nella digestione enzimatica dell'alcol con formazione di acetaldeide, sostanza tossica che scatena la sintomatologia. **Sintomi:** a brevissima insorgenza, anche dopo 10 minuti dal pasto, sono caratterizzati da vomito, cefalea, rossore al volto, tachicardia, difficoltà respiratoria. La sintomatologia persiste per alcune ore e può comparire con l'assunzione di alcol anche a distanza di 72 ore dal pasto.

Sindrome coprinica (breve latenza)

Coprinopsis atramentaria



Coprinopsis atramentaria

FOTO V. CURCIO

Cappello: grigio metallico, inizialmente ovoidale, poi campanulato, infine appianato, deliquescente a maturità avanzata (si dissolve in una massa liquida e nera simile all'inchiostro). **Lamelle:** fitte, inizialmente grigiastre, poi rosate infine nere per la maturazione delle spore (melanosporeo). **Gambo:** cilindrico, liscio, cavo al suo interno. **Carne** esigua bruno grigiasta priva di odore particolare. **Habitat:** saprofita con crescita a gruppi nei boschi o nelle aree prative dalla primavera all'autunno.

– SINDROME PAXILLICA O CITOTOSSICA ALLERGICA (BREVE LATENZA)

Riconosce come causa scatenante una sensibilizzazione improvvisa verso un componente, denominato involutina, contenuto in *Paxillus involutus* ed in *Paxillus filamentosus*. La reazione, anche grave e con casi segnalati di mortalità, è di tipo allergico ed avviene in persone che avevano già consumato in precedenza tali funghi restandone sensibilizzati. **Sintomi:** con insorgenza, mediamente, dopo 3 ore dall'ingestione sono rappresentati da malessere generale, vomito, dolore addominale, diarrea. Seguono segni clinici di anemia emolitica di tipo autoimmune, con ittero, collasso cardiocircolatorio ed insufficienza renale.

Sindrome paxillica (breve latenza)

Paxillus involutus



Paxillus involutus

FOTO G. DI CELLO

Cappello ocraceo, vellutato, che si macchia alla contusione, margine involuto. **Lamelle** ocracee, decorrenti che imbruniscono al tocco. **Gambo** da più chiaro a concolore al cappello. **Carne** amara, giallo brunastra. **Habitat** simbiote di latifoglie

SINDROME PSICODISLEPTICA O ALLUCINOGENA (BREVE LATENZA)

È causata dal consumo di funghi appartenenti ai generi *Psilocybe*, *Stropharia*, *Panaeolus*. Si tratta di una sindrome con sintomi prevalentemente neurologici provocati dalla psilocibina, che manifesta la sua tossicità entro 1 ora dal consumo. **Sintomi:** cefalea, stordimento, vertigini, ipotensione e in alcuni casi nausea e vomito. Seguono allucinazioni, alterazione della percezione del tempo e dello spazio, delirio, confusione mentale, disorientamento, agitazione ed aggressività. La sintomatologia regredisce di solito spontaneamente entro 12-48 ore, tuttavia sono segnalati casi di complicazioni gravi con convulsioni, coma, decesso o danni al sistema nervoso centrale con psicosi cronica.

Specie a commestibilità condizionata

Alcune specie, pur considerate commestibili, necessitano di una adeguata e prolungata cottura (almeno 20 minuti) con l'eliminazione dell'acqua di cottura, prima di essere consumate. Sono specie che contengono tossine che vengono neutralizzate con il calore (termolabili). Fra queste *Armillarea mellea*, *Amanita vaginata*, *Amanita rubescens*, *Morchella sp.*, e alcune specie a pori rossi, *Neoboletus luridiformis* (*Boletus erythropus*), *Suillellus luridus* (*Boletus luridus*), che in alcune zone della Calabria vengono particolarmente apprezzate ma il cui consumo continua a destare perplessità per i casi d'intossicazione con sintomatologia di tipo gastrointestinale, che continuano a causare se consumate poco cotte. Relativamente al consumo di *Suillellus luridus* (*Boletus luridus*) vi sono, altresì, segnalazioni di casi di malessere se assunto assieme a bevande alcoliche, per la sua probabile interferenza nel metabolismo dell'alcol. (Budmiger H, Kocher F. - *Boletus luridus and alcohol. Case report* - Schweiz Med Wochenschr. 1982).



Armillarea mellea

FOTO G. DI CELLO



Amanita vaginata

FOTO A. DE MARCO




Amanita rubescens

FOTO G. DI CELLO



Morchella sp.

FOTO V. CURCIO



Neoboletus luridiformis

FOTO A. DE MARCO



Suillellus luridus

FOTO A. CONTIN

Cosa fare

in caso di malessere dopo aver consumato funghi

NO **NON sottovalutare i sintomi** (nausea, vomito, dolore addominale, diarrea), **NON** attendere la loro scomparsa, **NON** tentare di curarsi da soli.

SI **Contattare** il proprio **medico curante** o recarsi al più vicino **pronto soccorso**. **Portare con se** l'eventuale residuo del pasto, tutti i funghi della stessa partita eventualmente conservati in casa, sia crudi che cotti, i residui della pulitura dei funghi.

INFORMAZIONI importanti da riferire al Medico

- Orario del pasto e orario di inizio della sintomatologia;
- Origine dei funghi (acquistati, ricevuti in dono, consumati presso un locale pubblico, ecc.)
- Quantità di funghi consumati e modalità di preparazione/conservazione (crudi, cotti, alla piastra, al forno, in umido, freschi, congelati, secchi, sott'olio, ecc.)
- Numero delle persone che hanno consumato lo stesso pasto;
- Numero di eventuali ulteriori pasti consumati a base di funghi e orari di consumo;
- Eventuale consumo di funghi misti o solo appartenenti allo stesso genere.

Tale ultima informazione è rilevante al fine di valutare l'eventualità di una intossicazione mista con sintomi da intossicazione a breve latenza che potrebbero mascherare però i sintomi di una più grave e concomitante intossicazione a lunga latenza.

Sarà cura del Medico

- **applicare** gli *"Indirizzi operativi regionali per la gestione dei casi di intossicazione da funghi"* (Decreto Dir. Gen. n. 1648 del 05.03.2015, Dip. Tutela della Salute Regione Calabria)*;
- **contattare** al più presto il **Micologo dell'Ispettorato Micologico** per l'identificazione delle specie fungine responsabili;
- **contattare il CAV (Centro Antiveneni)** per la consulenza tossicologica. **Rilevante è il ruolo di tale consulenza** che, in attesa dell'esame dei reperti da parte del Micologo, fornisce al Medico le indicazioni di massima per avviare la terapia e nel sospetto di una possibile intossicazione grave, consiglia il protocollo terapeutico più idoneo seguendo poi l'evoluzione clinica;
- **istituire la terapia del caso** che tende a: allontanare il più velocemente possibile le tossine dall'organismo mediante **gastrolusi** (lavanda gastrica); impedire l'ulteriore assorbimento delle tossine mediante la somministrazione di **carbone vegetale in polvere**; **ripristinare i liquidi ed i sali persi** con il vomito e la diarrea con infusione di soluzioni in vena (fleboclisi); **sostenere le condizioni vitali** eventualmente compromesse;

* Il Decreto n.1648 del 05 marzo 2015, disegna la giusta sinergia d'azione nei casi d'intossicazione da funghi tra Medico, Tossicologo e Micologo, rappresentando così un solido punto di riferimento procedurale per le diverse professionalità coinvolte, la cui attività, ciascuna per le rispettive competenze, risulta essere efficacemente chiara, coordinata e finalizzata all'esclusivo interesse del paziente.

Dove far controllare i funghi

Gli Ispettorati Micologici

In ciascuna delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria è presente un Ispettorato Micologico che fa capo al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, SIAN, nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione. Gli Ispettorati sono organizzati con uno o più Centri di Controllo Micologico territoriali presso i quali è possibile sottoporre a controllo di commestibilità i funghi raccolti da privati per il proprio consumo. Questo servizio è reso, in forma gratuita, presso le sedi negli orari prestabiliti o previo contatto telefonico.

ASP	Sede	Telefono – Fax
COSENZA	COSENZA - Via Tagliamento 15	0984- 8933154 - 8933508
	ROGLIANO - Via E. Altomare	0984-987114 – 987121
	AMANTEA - Via Ticino n° 15	0982 -491280
	CASTROVILLARI - Via Po n. 74	0981-485518 - 515 - 551
	S. MARCO ARGENTANO - Via Mons. Castrillo	0984 -519229 -519231
	ROSSANO - Via Papa Zaccaria	0983-517464
CATANZARO	CARIATI - Via G. Natale	0983-517464 -941435 -37
	TREBISACCE - Via P.M. Curie	0981-509288 - 509229
	CORIGLIANO - Via Walth Disney	0983-440880
	CATANZARO - Via Aciri, n. 24	0961-7033526 -508 - 724637
	SOVERATO - P.zza Casalnuovo	0967-539505
	LAMEZIA TERME - Via Sottotenente Notaro, 2 (vecchio Ospedale)	0968-208317
CROTONE	SOVERIA MANNELLI - Via Rosario Rubettino (c/o Comunità Montana)	0968-662364
	CROTONE - Via Saffo	0962-924547-924641-43-45
	VIBO VALENTIA - Corso V. Emanuele III n. 24	0963-962348 - 345
	REGGIO CALABRIA - C. Via Rosselli (Pal Sanità)	0965-347823 - 54 -09
	SIDERNO - Piazza Oreste Sorace (ex Ospedale)	0964-399945 - 19 - 20 - 41
	PALMI - VIA ROSSELLI	0966-21260 - 418295
REGGIO CALABRIA	POLISTENA - VIA MONTEGRAPPA	0966-942216
	TAURIANOVA - VIA S. ALESSI	0966-613282

I compiti dell'Ispettorato Micologico

- interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
- organizzazione dei corsi e degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine e svolgimento degli esami;
- rilascio della certificazione di commestibilità dei funghi destinati al commercio;
- consulenza gratuita della commestibilità dei funghi raccolti dai privati e destinati al consumo diretto;
- vigilanza e controllo dei funghi: raccolta, commercializzazione, vendita al dettaglio, lavorazione, somministrazione.
- consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i Medici di Medicina Generale;
- supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il conseguimento dell'attestato utile ai fini del rilascio della tessera professionale.

NORMATIVA

- **Legge 23.8.93, N. 352:** - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
- **D.P.R. 14-7-1995, N. 376:** - Modifiche della Legge 23.8.93, n. 352
- **Legge Regionale 26 novembre 2001, N. 30** - Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati. (e s.m.i. di cui alle LL.RR. 31 marzo 2009, n. 9, 23 dicembre 2011, n. 47 e 27 dicembre 2012, n. 69)
- **D.M. 17.3. 1989:** - Misure fitosanitarie per importazione funghi freschi coltivati
- **D.M. 29.11.1996, N. 686:** - Criteri e modalità per rilascio attestato Micologo
- **D.M. 9.10.1998:** - Menzioni qualificative per funghi secchi
- **O.M. 20 agosto 2002:** - Divieto raccolta, Vendita, commercializzazione, "Tricholoma equestre"
- **O.M. 3 aprile 2002:** - Divieto vendita funghi in forma itinerante
- **Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- **D.M. 27.2.1996, N. 209** e s.m.i.: - Additivi alimentari
- **O.M. 18.7.1990 - D.M. 07.05.04:** - Residui antiparassitari
- **Reg. CE N.737/90 - Reg. CE N. 1635/2006:** - Radioattività
- **D.lgs 27/01/1992, N. 110:** - Alimenti surgelati
- **Reg. CE 178/2002:** - Principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
- **REG. CE 882/04:** - Controlli Ufficiali in sicurezza alimentare
- **REG. UE 2017/625** - Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali che abroga il Reg. 882/04
- **REG. CE 852/04:** - Igiene dei prodotti alimentari
- **REG. CE N. 1924/2006 del Parlamento europeo e del CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 relativo alle** - indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
- **REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del CONSIGLIO del 17 dicembre 2013** - recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- **DCA N. 106/2014**
- **DDG Tutela della Salute e Politiche Sanitarie N. 14338 del 15/10/2013** - Indirizzi operativi per la gestione dei casi di intossicazione da funghi
- **Reg. CE N. 1881/2006:** - Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

INDICE DELLE SPECIE TRATTATE

A	<i>Agaricus arvensis</i>	84	<i>Inocybe s. l.</i>	144
	<i>Agaricus bisporus</i>	83	<i>Inocybe erubescens</i>	91
	<i>Agaricus campestris</i>	82	L	
	<i>Agaricus sylvicola</i>	114		
	<i>Agaricus xanthodermus</i>	135		
	<i>Amanita caesarea</i>	68		
	<i>Amanita muscaria</i>	142		
	<i>Amanita muscaria f. aureola</i>	69		
	<i>Amanita ovoidea</i>	127		
	<i>Amanita pantherina</i>	143		
	<i>Amanita phalloides</i>	110		
	<i>Amanita proxima</i>	126		
	<i>Amanita verna</i>	112		
	<i>Amanita virosa</i>	113		
B	<i>Armillaria mellea</i>	100	<i>Lecanellum lepidum (porcino)</i>	63
			<i>Lepiota brunneincarnata</i>	115
			<i>Lepiota s.l.</i>	115
	<i>Boletus aereus</i>	60	M	
	<i>Boletus edulis</i>	58		
C	<i>Boletus pinophilus</i>	61		
	<i>Boletus reticulatus</i>	59		
	<i>Butyriboletus regius</i>	62	O	
	<i>Caloboletus radicans</i>	67		
E	<i>Caloboletus calopus</i>	67	P	
	<i>Calocybe gambosa</i>	90		
	<i>Cantharellus cibarius</i>	92		
	<i>Chlorophyllum molybdites</i>	140		
	<i>Chlorophyllum rachodes</i>	141	R	
	<i>Clitocybe nebularis</i>	137		
	<i>Clitocybe s.l.</i>	145		
	<i>Clitopilus prunulus</i>	146		
	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	147	S	
	<i>Cortinarius orellanus</i>	119		
	<i>Cortinarius rubellus</i>	120		
	<i>Craterellus cornucopioides</i>	96		
F	<i>Chroogomphus rutilus</i>	121	T	
	<i>Entoloma sinuatum</i>	136		
	<i>Fistulina hepatica</i>	127		
G			S	
	<i>Galerina marginata</i>	117		
	<i>Galerina s. l.</i>	116		
	<i>Gyroporus castaneus</i>	66		
	<i>Grifola frondosa</i>	106	T	
	<i>Gymnopilus junonius</i>	101		
	<i>Gyromitra esculenta</i>	122		
	<i>Gyromitra gigas</i>	122		
			T	
	<i>Hapalopilus rutilans</i>	124		
	<i>Hydnum repandum</i>	95		
	<i>Hydnum rufescens</i>	94		
H	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	93	T	
	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	97		
	<i>Hygrophorus pudorinus</i>	98		
	<i>Hygrophorus russula</i>	99		
	<i>Hypholoma fasciculare</i>	130	T	
			T	

INDICE

ELEMENTI DI CONOSCENZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE	9
Il territorio	9
La biodiversità nei boschi calabresi	10
Il bosco	12
La tutela dell'ambiente	15
BIOLOGIA ED ECOLOGIA DEI FUNGHI	17
Cosa sono	17
Ruolo in natura	19
Come si riproducono	20
Come si nutrono	23
RICONOSCERE I FUNGHI - Elementi di Sistematica, Tassonomia e Determinazione	28
La classificazione scientifica	28
La classificazione empirica	29
La nomenclatura	31
La determinazione	32
L'osservazione	32
I caratteri morfologici	33
I caratteri organolettici	40
La classificazione secondo il colore della sporata sporotaxa	41
LA RACCOLTA DEI FUNGHI	42
Le condizioni ambientali	42
La nascita	44
Le regole principali per la raccolta	45
I FUNGHI NELL'ALIMENTAZIONE	49
Le principali regole per il consumo	51
Le false credenze	52
Le conservazione domestica e il rischio Botulismo	53
LA COMMERCIALIZZAZIONE e le regole per gli OSA (Operatori del Settore Alimentare)	55
Le regole per la vendita dei funghi freschi spontanei	55
La vendita dei funghi freschi coltivati	56
La vendita dei funghi secchi o conservati	57
Le responsabilità degli OSA	57
LE PRINCIPALI SPECIE COMMESTIBILI E COMMERCIALIZZABILI	58
- <i>Boletus edulis</i> (porcino di faggio)	58
- <i>Boletus reticulatus</i> (porcino estivo)	59
- <i>Boletus aereus</i> (porcino nero)	60
- <i>Boletus pinophilus</i> (porcino di pino)	61
- <i>Butyriboletus regius</i> (boletto reale)	62
- <i>Leccinellum lepidum</i> (porcinello)	63
- <i>Suillus luteus</i> (bavoso)	64
- <i>Suillus granulatus</i> (bavoso)	65
- <i>Amanita caesarea</i> (ovolo buono)	68
- <i>Macrolepiota procera</i> (mazza di tamburo)	70
- <i>Lactarius deliciosus</i> (rosito)	72
- <i>Pleurotus ostreatus</i> (gelone)	74
- <i>Russula chloroides</i> (gravino)	75
- <i>Russula delica</i> (gravino)	76
- <i>Russula virescens</i> (vedone)	78

- <i>Russula cyanoxantha</i> (colombina)	79
- <i>Russula vesca</i> (colombina)	80
- <i>Russula aurea</i> (colombina dorata)	81
- <i>Agaricus campestris</i> (prataiolo)	82
- <i>Agaricus bisporus</i> (prataiolo)	83
- <i>Agaricus arvensis</i> (prataiolo)	84
- <i>Tricholoma portentosum</i> (portentoso)	86
- <i>Tricholoma terreum</i> (moretta)	87
- <i>Tricholoma imbricatum</i> (monachella)	88
- <i>Calocybe gambosa</i> (prugnolo)	90
- <i>Cantharellus cibarius</i> (galletto)	92
- <i>Hydnum rufescens</i> (steccherino)	94
- <i>Hydnum repandum</i> (steccherino dorato)	95
- <i>Craterellus cornucopioides</i> (trombetta da morto)	96
- <i>Hygrophorus marzuolus</i> (marzuolo)	97
- <i>Hygrophorus pudorinus</i> (pudorino)	98
- <i>Hygrophorus russula</i> (lardaiolo)	99
- <i>Armillaria mellea</i> (chiodino)	100
- <i>Morchella esculenta</i> (spugnola)	102
- <i>Ramaria botrytis</i> (manine o manuzze)	104
- <i>Grifola frondosa</i> (nassa o rucilla)	106
LE PRINCIPALI SPECIE TOSSICHE	108
SINDROMI A LUNGA LATENZA	108
Sindrome falloidea	109
- <i>Amanita phalloides</i>	110
- <i>Amanita verna</i>	112
- <i>Amanita virosa</i>	113
- <i>Genere Lepiota s.l.</i>	115
- <i>Genere Galerina s.l.</i>	116
Sindrome orellanica	118
- <i>Cortinarius orellanus</i>	119
- <i>Cortinarius rubellus</i>	120
Sindrome giromitrica	122
- <i>Gyromitra esculenta</i>	122
- <i>Gyromitra gigas</i>	122
Sindrome rabdomiolitica	123
- <i>Tricholoma equestre</i>	123
Sindrome da acido poliporico o neurotossica tardiva	124
- <i>Hapalopilus rutilans</i>	124
Sindrome acromelalgica o erytromelalgica	125
- <i>Paralepistopsis amoenolens</i>	125
Sindrome norleucinica o nefrotossica	126
- <i>Amanita proxima</i>	122
SINDROMI A BREVE LATENZA	128
Sindrome gastrointestinale	128
- <i>Omphalotus olearius</i>	129
- <i>Hypholoma fasciculare</i>	130
- <i>Tricholoma pardinum</i>	132
- <i>Lactarius torminosus</i>	134
- <i>Agaricus xanthodermus</i> (gruppo xanthodermatei)	135
- <i>Entoloma sinuatum</i>	136

- <i>Clitocybe nebularis</i>	137
- <i>Ramaria formosa</i>	138
- <i>Chlorophyllum molybdites</i>	140
Sindrome panterinica o neurotossica anticolinergica	142
- <i>Amanita muscaria</i>	142
- <i>Amanita pantherina</i>	143
Sindrome muscarinica o neurotossica colinergica	144
- <i>Inocybe s.l.</i>	144
- <i>Clitocybe s.l.</i>	145
Sindrome coprinica	147
- <i>Coprinopsis atramentaria</i>	147
Sindrome paxillica o citotossica allergica	148
- <i>Paxillus involutus</i>	148
Sindrome psicodisleptica allucinogena	148
SPECIE A COMMESTIBILITÀ CONDIZIONATA	149
- <i>Amanita vaginata</i> - <i>Armillarea mellea</i> - <i>Amanita rubescens</i> - <i>Morchella s.l.</i> - - <i>Neoboletus luridiformis</i> , <i>Suillellus luridus</i>	149
COSA FARE IN CASO DI MALESSERE DOPO AVER CONSUMATO FUNGHI	150
DOVE FAR CONTROLLARE I FUNGHI. Gli Ispettorati Micologici	151
NORMATIVA	152



Antonio Contin

Macrolepiota procera



Antonio Contini

Boletus reticulatus



Antonio Contini

Boletus pinophilus



Antonio Contini

Boletus aereus



Antonio Contini

Boletus edulis



Lactarius deliciosus



Calocybe gambosa

DEGLI STESSI AUTORI

REGIONE CALABRIA
UNIVERSITÀ REGIONALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNICHE SANITARIE

REGIONE CALABRIA
UNIVERSITÀ REGIONALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNICHE SANITARIE

**il consumo
in sicurezza
dei funghi**

a cura di
Ernesto Narra e Dario Macchioni

<http://old.regione.calabria.it/sanita/allegati/ssr/opuscolo.pdf>

REGIONE CALABRIA
UNIVERSITÀ REGIONALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNICHE SANITARIE

REGIONE CALABRIA
UNIVERSITÀ REGIONALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNICHE SANITARIE

**VADEMECUM PER IL
RACCOLTITORE**

**Come prevenire
e cosa fare in caso di
Intossicazioni
da funghi**

testo a cura di
Ernesto Narra e Dario Macchioni

<http://old.regione.calabria.it/sanita/allegati/ssr/opuscolo.pdf>

**La piccola flora
nel regno dei
funghi**

<https://www.epicentro.iss.it/strumenti/pdf/flora1siti.pdf>